東日本手外科研究会	2017年2月　札幌	小児肘関節脱臼の治療
		橈骨動脈穿通枝脂肪弁による正中神経の被覆
第47回日本人工関節学会	2017年2月　宜野湾	PCL温存mobile-bearing型人工膝関節(TMK)のin vivo摩耗粉分析
		PS型人工関節置換術後膝蓋骨骨折の検討
		加速度計ポータブルナビゲーションシステムを用いたTKAの3DCTによる精度評価
		セラミックオンセラミックTHAのセラムックコンポーネント破損からステム周囲メタローシスを生じた1例
		全人工股関節置換術後のカップ周囲骨密度変化の検討
		人工膝関節全置換術後mid-flexion域での膝関節不安定性 -PS型とmedial pivot型の比較-
		リバース型人工肩関節置換術における術前計画ソフトウェア使用によるグレノイドコンポーネント設置位置評価
		リバース型人工肩関節置換術における肩甲骨関節窩ベースプレートのスクリュー設置状態の検討
		リバース型人工肩関節置換術のラーニングカーブについて
		骨移植を併用したリバース型人工肩関節置換術はグレノイドコンポーネントの設置状態に影響するか？
日本再生医療学会	2017年3月　仙台	iPS細胞由来神経前駆細胞を付加したハイブリッド型人工神経 老年マウス坐骨神経欠損における神経再生
第11回日本CAOS研究会	2017年3月　新潟	肩甲骨の三次元画像解析を目的としたプログラムの開発
		リバース型人工肩関節全置換術後リハビリテーションへの三次元画像解析手法の有用性の検討
		リバース型人工肩関節置換術術後の経時的肩甲骨動態解析
		リバース型人工肩関節置換術における３D術前計画ソフトウェア使用によるグレノイドコンポーネント設置位置精度の変化
		TKAにおけるCAOS－正確な目標設定と正確な評価－
		人工膝関節全置換術術後のPatellar component -tibial postインピンジメントーPS型とconstrained型の比較－
		TKA後インプラントアライメント評価－3Dと2Dの比較－
第128回中部日本整形災害外科学会	平成29年4月　神戸	表在性軟部腫瘍に関するMRIの有用性
		類上皮肉腫からの嚢胞性肺転移により気胸を発症した1例
		類骨骨腫に対するRFAの経時的画像変化を確認できた1例
		軟部腫瘍に対する超音波Color Doppler検査と造影MRIによる腫瘍内血流比較
		超音波Color Doppler検査で軟部腫瘍の良悪性鑑別は可能か
		当院における高齢者の悪性骨軟部腫瘍に対する治療
		腫瘍内に血腫を伴った大腿悪性軟部腫瘍の1例
		脊椎外来通院患者に占めるサルコペニアの頻度と特徴ー 地域住民高齢者との比較研究ー
		造影CTを用いた鏡視下前十字靭帯再建術術後の深部静脈血栓症・肺塞栓症の発生率と危険因子についての検討
		膝関節鏡手術における深部静脈血栓症・肺塞栓症の発生率-靭帯再建術vs半月縫合術vs骨切り併用手術-
		外側円板状半月板損傷に対する辺縁残存手術は亜全摘手術より離断性骨軟骨炎を抑制する
第46回日本脊椎脊髄病学会学術集会	平成29年4月　札幌	椎間孔狭窄比(FSR)は有症状の腰椎椎間孔狭窄に対し手術必要症例の予測ツールとなりえる
		腰椎椎間孔狭窄の手術必要例・保存療法における椎間孔狭窄比(FSR)の違い-3DMRIによる検討-
		DISHは有症状の腰部脊柱管狭窄症に関連する
		RA腰椎病変を合併する腰部脊柱管狭窄症の手術成績は非RA患者よりも劣っているか？
		第2仙椎alar iliac screwの逸脱回避のためのインレット撮影法-X線透視装置の設置シミュレーション-
		第2仙椎alar iliac screwの刺入点による安全域の違い
		脊椎外来通院患者と地域住民高齢者に占めるサルコペニアの頻度と特徴
		Lenke type 5Cの特発性側弯症に対する後方矯正固定術-術後にcoronal off balanceとなる因子は何か-
		腰椎椎間に力学負荷がかかると黄色靭帯は肥厚し、軟骨化生が生じる-隣接椎体間固定動物モデルによる検証-
		思春期特発性側弯症の後方矯正固定術後に認められる胸水貯留とリスク因子
		脊椎外科外来患者における体幹筋量・背筋力とサルコペニアとの関連
		サルコペニアが腰部脊柱管狭窄症の術後成績に及ぼす影響
		骨粗鬆症性椎体骨折後、骨癒合不全の高リスク患者に対する装具療法の効果
第61回日本リウマチ学会総会・学術集会	平成29年4月　福岡	関節リウマチに伴うサルコペニアは家庭用体組成計で予測できる
		関節リウマチにおけるHAQ高値はロコモティブシンドロームの危険因子である-CHIKARA研究より-
		抗CCP抗体高値の関節リウマチ患者においてアバタセプトは抗TNF製剤と同等の関節破壊抑制効果を示した-AIRTIGHT study-
		RF/ACPA陽性乾癬性関節炎患者の臨床像

		関節リウマチ (RA)男性患者において matrix metalloproteinase (MMP)-3は一年後の関節破壊進行と独立して関連した
		超音波エラストグラフィによる関節リウマチ患者の正中神経硬度に関する検討
		関節リウマチ患者に対するトシリズマブの1stバイオでの継続率と有効性に関する検討
		ゴリムマブ100mgと50mg投与患者における関節エコー所見からみた滑膜炎の抑制効果に関する検討
		関節リウマチ患者の骨粗鬆症に対するデノスマブの治療効果は原発性骨粗鬆症患者に対する効果と同等である
		関節リウマチの疾患活動性変化がアディポサイトカインに与える影響 -TOMORROW 研究から-
		リウマチ罹患は関節リウマチ新治療時代でも強い死亡の危険因子である - TOMORROW研究6年間の調査より-
		関節エコー所見が鑑別診断に有用であったSAPHO症候群の３例
第60回日本手外科学会学術集会	平成29年4月　名古屋	生体吸収性人工神経による末梢神経の癒着防止効果
		老年マウス坐骨神経損傷モデルにおけるiPS細胞付加ハイブリッド型人工神経の有効性
		インドシアニングリーン蛍光法を用いた末梢神経絞扼性障害における末梢神経微小血管の描出
		Freestyle perforator flapによる上肢軟部組織再建術
		インドシアニングリーン蛍光法を用いた末梢神経の血流評価法
		鏡視下大菱形骨部分切除術に長橈側手根伸筋半裁腱を用いたsuspensionplastyを併用した母指CM関節症の治療
		上肢手術における局所静脈内麻酔法の有効性の検討
第90回日本整形外科学会学術総会	平成29年5月　仙台	表在性軟部腫瘍に関するMRIの有用性
		高齢者における原発性悪性骨軟部腫瘍に関する予後因子
		軟部腫瘍の超音波画像診断、腫瘍内血流を中心に
		高悪性度骨軟部腫瘍Cancer survivorにおける抗癌剤治療後の妊娠と出産の安全性
		単純性骨嚢腫の踵骨と長管骨では病態が異なる
		変形性肩鎖関節症に対する鏡視下鎖骨遠位端切除術の中期臨床成績と画像評価
		ArthroTunnelerTMを用いた鏡視下腱板修復術後における骨孔亀裂の検討
		肩関節鏡視下手術における術前・術後の臨床成績評価－患者立脚型評価と医師主導型評価の違いから－
		腱板修復良好症例の脂肪変性及び筋萎縮の評価
		鏡視下腱板修復術におけるスーチャーブリッジ法と骨孔法の治療成績比較
		CTによるリバース型人工肩関節置換術前後の肩甲骨関節窩形態及びグレノイドコンポーネント設置位置評価
		生体吸収性人工神経による末梢神経の癒着防止効果
		老年マウス坐骨神経損傷モデルにおけるiPS細胞付加ハイブリッド型人工神経の有効性
		指動脈穿通枝を用いた有茎脂肪弁による手指慢性骨髄炎の治療
		関節リウマチ患者における画像的腰椎病変および腰痛の危険因子の同定
		DISHの存在は腰部脊柱管狭窄症に影響を及ぼす
		関節リウマチ患者に腰椎病変や腰痛は多いか　-健常者との比較研究-
		関節リウマチに合併するサルコペニアは家庭用体組成計でも予測可能である
		関節リウマチにおけるロコモティブシンドロームの危険因子解析-CHIKARA研究より
		関節リウマチにおけるアディポサイトカイン経年変化と疾患活動性変化の関係性-TOMORROW研究からの解析-
		関節リウマチ患者に対するトシリズマブの1stBIOでの治療効果と継続率についての検討
		関節リウマチ患者の骨粗鬆症に対するデノスマブの治療効果は原発性骨粗鬆症患者に対する効果と同等である
		関節リウマチ新治療時代でもリウマチ罹患は強い死亡の危険因子である-TOMORROW研究6年間の調査より-
		超音波エラストグラフィを用いた関節リウマチ患者における正中神経硬度の検討
		RF/ACPA陽性乾癬性関節炎患者は陰性患者と比し臨床像に差を認めない
		保存療法としてのダイナミック運動療法の検討
		17歳以下若年者スポーツ選手に対するACL再建術後のスポーツ復帰：二重束再建術とBTBによる再建術の比較
		膝関節鏡手術における深部静脈血栓症・肺塞栓症の発生率-靭帯再建術vs半月縫合術vs骨切り併用手術-
		外側円板状半月板損傷に対する辺縁残存手術は亜全摘手術より離断性骨軟骨炎を抑制する
		外側円板状半月板の症状と手術療法
		新旧Fast-Fixを用いた半月板縫合術後のcyst発生率の比較