



薬剤部DI室(2274) No. 236

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/hosp/yakuzai/>

## 掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 .....	2
2-2 販売中止による取扱い中止 .....	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....	3
3) 投薬日数制限解除 .....	3
4) 使用期限変更 .....	3
5) 販売元変更 .....	3
3-2 最近のお知らせ .....	3
4 添付文書改訂情報 .....	3
5 薬剤情報提供 .....	6

# 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
カンデサルタン錠4mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤	平成27年2月19日(木)
カンデサルタン錠8mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤	平成27年2月19日(木)
バルサルタン錠80mg「EE」	バルサルタン	選択的AT <sub>1</sub> 受容体ブロッカー	平成27年2月24日(火)
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビズマブ (遺伝子組換え)	眼科用VEGF阻害剤(ヒト化抗VEGFモノクローナル抗体Fab断片)	平成27年2月24日(火)

# 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

## 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ エルカルチン錠100mg	エルカルチンFF内用液10%の採用に伴う中止	平成27年1月30日(金)
※ エンシュア・リキッド(パニラ)	エネーボ配合経腸用液の採用に伴う中止	平成27年2月2日(月)
※ ウテメリン錠5mg	薬事委員会の決定による中止	平成27年2月6日(金)
※ コニール錠8mg	同効薬見直しに伴う中止	平成27年2月12日(木)
※ オイラゾンクリーム0.05%	ジオトリフ錠40mgの採用に伴う中止	平成27年2月16日(月)
※ プロプレス錠4mg	カンデサルタン錠4mg「あすか」の採用に伴う中止	平成27年2月18日(水)
※ プロプレス錠8mg	カンデサルタン錠8mg「あすか」の採用に伴う中止	平成27年2月18日(水)
※ デイオバン錠80mg	バルサルタン錠80mg「EE」の採用に伴う中止	平成27年2月23日(月)
ルセンティス硝子体内注射液 2.3mg/0.23mL	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mLの採用に伴う中止	平成27年2月24日(火)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

## 2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

# 3 今月のトピックス

## 3-1 医薬品に関する事項

### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
スタレボ配合錠L100	1T:レボドパ100mg/ カルビドパとして10mg/ エンタカボン100mg	レボドパ/ カルビドパ水和物/ エンタカボン	抗パーキンソン剤
タペンタ錠 25mg/50mg/100mg	1T: 25mg/50mg/100mg	タペンタール塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒	1包:2.5g		漢方製剤

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
パロチン錠10mg	販売中止のため	平成27年2月28日(土)

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

「ビタノイリンカプセル50」  
42ヵ月 → 36ヵ月 (安定性試験の結果より)  
「ポリトーゼカプセル」  
48ヵ月 → 36ヵ月 (安定性試験の結果より)

5) 販売元変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 医薬品等安全性情報No. 320 平成27年1月30日
- ・ 「エルカルチン錠100mg」取扱い中止について 平成27年1月30日
- ・ 「エンシュア・リキッド(バニラ)」取扱い中止について 平成27年2月2日
- ・ ラミクタール錠(ラモトリギン)安全性速報 平成27年2月5日
- ・ 「ウテメリン錠5mg」取扱い中止について 平成27年2月6日
- ・ アムビゾーム点滴静注用50mgにおけるバイアル内の陰圧強化に伴う調製時の注意点について 平成27年2月6日
- ・ 「コニール錠8mg」取扱い中止について 平成27年2月12日
- ・ 「オイラゾンクリーム0.05%」取扱い中止について 平成27年2月16日
- ・ 「カンデサルタン錠4mg/8mg「あすか」」取扱い開始および「プロプレス錠4mg/8mg」取扱い中止について 平成27年2月18日
- ・ 「バルサルタン錠80mg「E E」」取扱い開始および「ディオバン錠80mg」取扱い中止について 平成27年2月23日
- ・ 「ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL」取扱い開始及び「ルセンチス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL」の取扱い中止について 平成27年2月24日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
アデムパス錠0.5mg/1.0mg/2.5mg	リオシグアト
イーケブラドライシロップ50%	レベチラセタム
イーケブラ錠250mg/500mg	レベチラセタム
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」	
献血ヴェノグロブリンIH5%静注 0.5g/10mL, 5g/100mL, 10g/200mL	人免疫グロブリンG

## II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アブルウェイ錠(サノフィ)	トホグリフロジン水和物	慎重・副
イーケプラドライシロップ (ユーシービージャパン=大塚製薬)	レベチラセタム	副
イーケプラ錠(ユーシービージャパン=大塚製薬)	レベチラセタム	副
オーグメンチン 配合錠(グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	副
カナグル錠(田辺三菱製薬=第一三共)	カナグリフロジン水和物	慎重・副
クラブモックス小児用配合ドライシロップ (グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	副
サワシリンカプセル・細粒(アステラス製薬)	アモキシシリン水和物	副
ジェブタナ点滴静注(サノフィ)	カバジタキセルアセトン付加物	注意
スーグラ錠(アステラス製薬)	イブラグリフロジンL-プロリン	慎重・副
ソブリアードカプセル(ヤンセンファーマ)	シメプレビルナトリウム	副
トラゼンタ錠 (日本ベーリンガーインゲルハイム=日本イーライリリー)	リナグリプチン	副
フォシーガ錠 (プリストル・マイヤーズ=アストラゼネカ=小野薬品)	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	慎重・副
ラベキュアパック(エーザイ)	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・ クラリスロマイシン	副
ラベファインパック(エーザイ)	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・ メロニダゾール	副
ランサップ(武田薬品)	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	副
ランピオンパック(武田薬品)	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	副
ルセファイ錠 (大正製薬=大正富山医薬品=ノバルティスファーマ)	ルセオグリフロジン水和物	慎重・副
アテディオ配合錠(味の素製薬=持田製薬)	バルサルタン・シルニジピン	その他
アテレック錠(味の素製薬=持田製薬)	シルニジピン	その他
アブラキサ点点滴静注用(大鵬薬品)	パクリタキセル(アルブミン懸濁型製剤)	その他
アブルウェイ錠(サノフィ)	トホグリフロジン水和物	その他
アレジオンドライシロップ (日本ベーリンガーインゲルハイム)	エピナスチン塩酸塩(ドライシロップ剤)(アレジオン)	その他
イーケプラドライシロップ (ユーシービージャパン=大塚製薬)	レベチラセタム	その他
イーケプラ錠(ユーシービージャパン=大塚製薬)	レベチラセタム	その他
エンブレル皮下注シリンジ(ファイザー=武田薬品)	エタネルセプト(遺伝子組換え)	その他
エンブレル皮下注ペン(ファイザー=武田薬品)	エタネルセプト(遺伝子組換え)	その他
オーグメンチン 配合錠(グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物(錠剤)	その他
カゾデックス錠・OD錠(アストラゼネカ)	ピカルタミド	その他
カナグル錠(田辺三菱製薬=第一三共)	カナグリフロジン水和物	その他
カンサイダス点滴静注用(MSD)	カスポファンギン酢酸塩	その他
キロサイドN注(日本新薬)	シタラビン(大量療法用製剤)	その他
キロサイド注(日本新薬)	シタラビン(通常量療法用製剤)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
クラバモックス小児用配合ドライシロップ (グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物(ドライシロップ剤)	その他
クレストール錠(アストラゼネカ＝塩野義製薬)	ロスバスタチンカルシウム	その他
サインパルタカプセル (塩野義製薬＝日本イーライリリー)	デュロキセチン塩酸塩	その他
サワシリンカプセル・細粒(アステラス製薬)	アモキシシリン水和物(錠剤、カプセル剤)	その他
シルニジピン錠「サワイ」(沢井製薬)	シルニジピン	その他
スーグラ錠(アステラス製薬)	イブラグリフロジンL-プロリン	その他
ストロメクトール錠(MSD＝マルホ)	イベルメクチン	その他
ゼルヤンツ錠(ファイザー)	トファシチニブクエン酸塩	その他
ソブリアードカプセル(ヤンセンファーマ)	シメプレビルナトリウム	その他
トラゼンタ錠 (日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー)	リナグリプチン	その他
パリエット錠10mg(エーザイ)	ラベプラゾールナトリウム(低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の効能を有する製剤)	その他
ビカルタミド錠「NK」(日本化薬)	ビカルタミド	その他
フォシーガ錠 (ブリistol・マイヤーズ＝アストラゼネカ＝小野薬品)	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	その他
メトレキサート錠2.5mg(ファイザー)	メトレキサート	その他
メトレキサート点滴静注液(ファイザー)	メトレキサート	その他
メトレキサート錠2mg「タナベ」(田辺三菱製薬)	メトレキサート	その他
メトレート錠2mg(参天製薬)	メトレキサート	その他
ラベキュアパック(エーザイ)	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	その他
ラベファインパック(エーザイ)	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	その他
ランサップ(武田薬品)	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	その他
ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」 (テバ製薬＝カイゲンファーマ)	ランソプラゾール(15mg)	その他
ランピオンパック(武田薬品)	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	その他
リウマトレックスカプセル(ファイザー)	メトレキサート	その他
リパクレオン顆粒・カプセル (アボットジャパン＝エーザイ)	パンクレリパーゼ	その他
ルセフィ錠 (大正製薬＝大正富山医薬品＝ノバルティスファーマ)	ルセオグリフロジン水和物	その他
静注用キシロカイン(アストラゼネカ)	リドカイン塩酸塩(静注用、点滴用)	その他
注射用メトレキサート50mg(ファイザー)	メトレキサート	その他
注射用メトレキサート5mg(ファイザー)	メトレキサート	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

## 5 薬剤情報提供

添付文書が改訂された薬品の薬剤情報を下記の内容に変更します。

薬品名	改訂箇所		変更内容
アブルウェイ錠	注意事項	下線部追加	ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、発熱、背中 <span style="border-bottom: 1px solid black;">の痛み</span> 、 <u>のどが渴く、皮膚が乾燥する等</u> がみられたらご連絡下さい。
イーケプラ錠500mg	注意事項	下線部追加	皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、発熱、 <span style="border-bottom: 1px solid black;">のどの痛み</span> 、出血しやすい、白目や皮膚が黄色くなる、吐き気、急に胃のあたりがひどく痛くなる、いらいらする、 <u>こわばり、尿の色が赤くなる等</u> がみられたらご連絡下さい。
イーケプラドライシロップ	注意事項	下線部追加	皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、発熱、 <span style="border-bottom: 1px solid black;">のどの痛み</span> 、出血しやすい、白目や皮膚が黄色くなる、吐き気、急に胃のあたりがひどく痛くなる、いらいらする、 <u>こわばり、尿の色が赤くなる等</u> がみられたらご連絡下さい。
カナグル錠100mg	注意事項	下線部追加	ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、発熱、背中 <span style="border-bottom: 1px solid black;">の痛み</span> 、 <u>のどが渴く、皮膚が乾燥する等</u> がみられたらご連絡下さい。
サワシリンカプセル250mg ／サワシリン細粒	注意事項	下線部追加	蕁麻疹、心臓がドキドキする、皮膚が熱い・斑に赤くなる、 <span style="border-bottom: 1px solid black;">のどの痛み</span> 、白目や皮膚が黄色くなる、発疹、発熱、手足のむくみ、尿の量が減る、頻回の下痢、吐き気、体がだるい、 <u>皮膚がはがれる等</u> がみられたらご連絡下さい。
スーグラ錠50mg	注意事項	下線部追加	ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、 <span style="border-bottom: 1px solid black;">のどが渴く</span> 、 <u>皮膚が乾燥する等</u> がみられたらご連絡下さい。
ソブリアードカプセル100mg	注意事項	下線部追加	皮膚のただれ、発疹、白目や皮膚が黄色くなる、関節の痛み、吐き気、頭痛、 <span style="border-bottom: 1px solid black;">からだのだるい</span> 、 <span style="border-bottom: 1px solid black;">のどの痛み</span> 、 <span style="border-bottom: 1px solid black;">発熱等</span> がみられたらご連絡ください。エファピレンツ、リアンピシシ、リアブチン <span style="border-bottom: 1px solid black;">を服用中の方は通常服用できません</span> 。
トラゼンタ錠5mg	注意事項	下線部追加	ふらつき、冷や汗、めまい、手足のふるえ、 <span style="border-bottom: 1px solid black;">白目や皮膚が黄色くなる等</span> がみられたらご連絡ください。
フォシーガ錠5mg	注意事項	下線部追加	ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、 <span style="border-bottom: 1px solid black;">のどが渴く</span> 、 <u>皮膚が乾燥する等</u> がみられたらご連絡下さい。
ルセフィ錠2.5mg	注意事項	下線部追加	ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、発熱、背中 <span style="border-bottom: 1px solid black;">の痛み</span> 、 <u>のどが渴く、皮膚が乾燥する等</u> がみられたらご連絡下さい。