



薬剤部DI室(2274) No. 237

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/hosp/yakuzai/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	4
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	4
2) 登録削除院外処方専用医薬品	5
3) 投薬日数制限解除	5
4) 使用期限変更	5
5) 販売元変更	5
3-2 最近のお知らせ	5
4 添付文書改訂情報	5
5 薬剤情報提供	7

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
イントラリボス輸液20%100mL	精製大豆油	静注用脂肪乳剤	平成27年3月26日(木)
クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール	爪白癬治療剤	平成27年4月1日(水)
ジーラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラスチム (遺伝子組換え)	持続型G-CSF製剤	
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロール fumarate 水和物	喘息治療配合剤	
ベルソムラ錠15mg	スボレキサント	オレキシン受容体拮抗薬/ 不眠症治療薬	
ポビドンヨード液10% 消毒用アプリケーション「オーツカ」 10mL/25mL	ポビドンヨード	外用殺菌消毒剤	
リクシアナ錠60mg	エドキサバントシル酸水和物	経口FXa阻害剤	
ニフレック配合内用剤		経口腸管洗浄剤	平成27年4月13日(月)
グリセリン「マルイシ」500mL	グリセリン		未定
ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物	骨吸収抑制剤	
トラマールOD錠25mg/50mg	トラマドール塩酸塩	がん疼痛・慢性疼痛治療剤	
レボフロキサシン錠500mg 「DSEP」	レボフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤	
生理食塩液「ヒカリ」250mL	塩化ナトリウム		

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
注射用エンドキサン100mg	ロンサーフ配合錠T15の採用に伴う中止	平成27年3月5日(木)
※ プロヘパール配合錠	ダクルインザ錠60mgの採用に伴う中止	平成27年3月6日(金)
※ ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒	ミニリンメルトOD錠60 μ gの採用に伴う中止	平成27年3月10日(火)
イントラリピッド輸液20%100mL	イントラリボス輸液20%100mLの採用に伴う中止	平成27年3月25日(木)
デトキソール静注液2g	シアノキッド注射用5gセットの採用に伴う中止	平成27年3月31日(火)
フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用の採用に伴う中止	平成27年3月31日(火)
ムーベン配合内用剤	ニフレック配合内用剤の採用に伴う中止	平成27年4月12日(日)
※ クラビット錠500mg	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」の採用に伴う中止	院内在庫なくなり 次第取扱い中止
グリセリン「ヨシダ」500mL	グリセリン「マルイシ」500mLの採用に伴う中止	

薬品名	備考	中止日	
ゾメタ点滴静注4mg/100mL	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」の採用に伴う中止	院内在庫なくなり 次第取扱い中止	
※ トラマールカプセル25mg	トラマールOD錠25mgの採用に伴う中止		
※ トラマールカプセル50mg	トラマールOD錠50mgの採用に伴う中止		
※ フェロベリン配合錠	ベルソムラ錠15mgの採用に伴う中止		
※ ペキロンクリーム 5% 10g	クレナフィン爪外用液10%の採用に伴う中止		
大塚生食注250mL	生理食塩液「ヒカリ」250mLの採用に伴う中止		
※ エックスフォージ配合錠	ARB配合剤見直しのため	平成27年3月31日(火)	
※ ミコンビ配合錠AP		院内在庫なくなり 次第取扱い中止	
※ ユニシア配合錠HD			
※ オングリザ錠5mg	DPP-4阻害剤見直しのため	院内在庫なくなり 次第取扱い中止	
※ ガストローム顆粒66.7% (1g/1包1.5g)	年度末中止薬品のため	平成27年3月31日(火)	
※ キックリンカプセル250mg			
※ 強カレスタミンコーチゾンコーワ軟膏 10g			
甲状腺末(チラーゼン末10%散)			
※ コスパノンカプセル40mg			
※ ストロカイン錠5mg			
※ スピール膏M			
※ ノイチーム錠90mg			
※ ベルサンチン錠25mg			
※ ローコール錠20mg			
※ EPLカプセル250mg			院内在庫なくなり 次第取扱い中止
※ 0.02%ヘキサック水W500mL			
※ アロチノロール塩酸塩錠10mg 「DSP」			
※ アロフト錠20mg			
エラプレース点滴静注液6mg			
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 0.5mL			
※ カイトリル細粒0.4%(2mg/包)			

薬品名	備考	中止日
※ サーティカン錠0.25mg	年度末中止薬品のため	院内在庫なくなり 次第取扱い中止
※ サーティカン錠0.75mg		
サクシゾン注射用300mg		
※ ザジテン点鼻液0.05% 8mL/瓶		
シムレクト静注用20mg		
スパニジン点滴静注用100mg		
スベニールディスボ関節注 25mg/2.5mL		
※ タガメット錠200mg		
※ デタントールR錠3mg		
フィジオゾール3号輸液 500mL		
※ プラザキサカプセル75mg		
プロゲホルモン筋注用25mg/1mL		
ボトックス注用100単位		
※ ラステットSカプセル50mg		
※ リノコートパウダースプレー鼻用 25μg		
※ リルテック錠50mg		
※ 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中 外」		

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
ジェイゾフトOD錠 25mg/50mg	1T:25mg/50mg	塩酸セルトラリン	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
タケキャブ錠10mg/20mg	1T:10mg/20mg	ボゾプラザンフマル塩酸塩	カリウムイオン競合型アシッドブロッカー/プロトンポンプインヒビター
トレリーフOD錠25mg	1T:25mg	ゾニサリド*	レボドパ賦活型パーキンソン病治療薬
ハイコバルカプセル500μg	1CP:500μg	コハ*マシト*	補酵素型ビタミンB ₁₂ 剤
パリエット錠5mg	1T:5mg	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害剤
リスパダール内用液1mg/mL (0.5mg/包)	1包(0.5mL):0.5mg	リスペリドン	抗精神病剤

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
オーアイエフ注射用500万IU	販売中止のため	平成27年3月31日(火)
クラリスロマイシンDS10%小児用「TYK」		
ゲフェニールソフトカプセル100mg		
ドプスカプセル100mg/200mg		
ノズレン細粒1%(5mg/1包0.5g)		

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

ニコリン注射液250mg
54ヵ月 → 36ヵ月 (安定性試験の結果より)

5) 販売元変更

ノーベルパール静注用250mg
アルフレッサ(株) → ノーベルファーマ(株) 平成27年4月1日

3-2 最近のお知らせ

- ・ 疑義照会詳細(平成27年1月分) 平成27年3月3日
- ・ 「注射用エンドキサン100mg」取扱い中止について 平成27年3月5日
- ・ 「プロヘパール配合錠」取扱い中止について 平成27年3月6日
- ・ 「ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒」取扱い中止について 平成27年3月10日
- ・ 「イントラリポス輸液20%100mL」取扱い開始および「イントラリビッド輸液20%100mL」取扱い中止について 平成27年3月25日
- ・ 「ヨードコート軟膏0.9%」取扱い中止について 平成27年3月25日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所: 院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
スンベプラカプセル100mg	アスナプレビル
ダクルインザ錠60mg	ダクラタスビル塩酸塩
点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	バンコマイシン塩酸塩

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所: 院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
エリキュース錠(ブリストル・マイヤーズ=ファイザー)	アピキサバン	副
キプレスチュアブル錠(杏林製薬)	モンテルカストナトリウム	副
キプレス細粒(杏林製薬)	モンテルカストナトリウム	副
キプレス錠(杏林製薬)	モンテルカストナトリウム	副
ザイティガ錠(ヤンセンファーマ)	アピラテロン酢酸エステル	慎重・注意・副
シングレアチュアブル錠(MSD)	モンテルカストナトリウム	副
シングレア細粒(MSD)	モンテルカストナトリウム	副
シングレア錠(MSD)	モンテルカストナトリウム	副
テラビック錠(田辺三菱製薬)	テラプレビル	注意
メマリー錠(第一三共)	メマンチン塩酸塩	副
ラミクタール錠・錠小児用(グラクソ・スミスクライン)	ラモトリギン	警告
アデムパス錠(バイエル薬品)	リオシグアト	その他
アドシルカ錠(日本イーライリリー=日本新薬)	タダラフィル (肺動脈性肺高血圧症の効能を有する製剤)	その他
アドリアシン注用(協和発酵キリン)	ドキシソルピシン塩酸塩 (悪性リンパ腫の効能を有する製剤)	その他
イクスタンジカプセル(アステラス製薬)	エンザルタミド	その他
エフピーOD錠(エフピー)	セレギリン塩酸塩	その他
ザイティガ錠(ヤンセンファーマ)	アピラテロン酢酸エステル	その他
ザルティア錠(日本イーライリリー=日本新薬)	タダラフィル (前立腺肥大症に伴う排尿障害の効能を有する製剤)	その他
タクロリムス錠0.5mg・1mg・1.5mg「参天」 (参天製薬)	タクロリムス水和物(ジェネリック製品)	その他
テラビック錠(田辺三菱製薬)	テラプレビル	その他
トロンビン液モチダソフトボトル(持田製薬)	トロンビン(液剤)(キット製剤)	その他
ネスブ注射液ブラシリンジ(協和発酵キリン)	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	その他
フルマリン静注用(塩野義製薬)	フロモキシセフナトリウム	その他
フロリドゲル経口用(持田製薬=昭和薬化)	ミコナゾール	その他
ベゲタミン-A・B配合錠(塩野義製薬)	クロルプロマジン塩酸塩・プロメタジン塩酸塩・ フェノバルビタール	その他
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用「サワイ」 (沢井製薬)	ミノサイクリン塩酸塩(顆粒剤、注射剤)	その他
ミノマイシンカプセル(ファイザー)	ミノサイクリン塩酸塩(錠剤、カプセル剤)	その他
ミノマイシン顆粒(ファイザー)	ミノサイクリン塩酸塩(顆粒剤、注射剤)	その他
メマリー錠(第一三共)	メマンチン塩酸塩	その他
ラミクタール錠・錠小児用(グラクソ・スミスクライン)	ラモトリギン	その他
経口用トロンビン細粒(持田製薬)	トロンビン(細粒剤)	その他
献血ヴェノグロブリンIH静注 (日本血液製剤機構=田辺三菱製薬)	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

5 薬剤情報提供

新規採用薬の薬剤情報を下記の内容で提供します。

薬品名	薬の作用	注意事項
クレナフィン爪外用液10% (4mL/本)	抗真菌薬で水虫などを治療する塗り薬です。	
トラマールOD錠 25mg/50mg	強い痛みをやわらげるお薬です。	心臓がドキドキする、かゆみや発疹がでる、体のふるえ等がみられたらご連絡下さい。セレギリン塩酸塩とは同時に使用できません。
ニフレック配合内用剤	下剤で、大腸検査、手術の前に腸をきれいにするお薬です。	腹痛、血便、嘔気・嘔吐、蕁麻疹がでる、心臓がドキドキする、めまい等がみられたらご連絡ください。
フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	気道の炎症を抑える作用と気管支を広げて呼吸を楽にする2つの作用を併せ持つ喘息治療剤です。	皮ふのかゆみ、じんま疹、から咳、息苦しさ等がみられたらご連絡下さい。結核性疾患の方は通常使用できません。
ベルソムラ錠15mg	ねつきをよくするお薬です。	イトラコナゾール、クラリスロマイシン、リナピル、サキナピル、ネルフィナピル、インジナピル、テラプレピル、ホリコナゾールとは同時に使用できません。
リクシアナ錠 60mg	血液を固まりにくくし、血栓ができるのを防ぎます。	便に血が混じる、青あざがでやすい、吐き気、しゃべりにくい等がみられたらご連絡下さい。
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防します。	蕁麻疹がでる、心臓がドキドキする、水膨れ、尿の量が減る、のどの痛み、貧血、頻回の下痢、息苦しくなる、筋肉が痛む、皮膚が斑に赤くなる、発熱、脱力感、冷や汗がでる、皮膚や白目が黄色くなる、全身倦怠感、出血しやすい等がみられたらご連絡下さい。妊婦や妊娠の可能性のある方、小児は通常服用できません。

添付文書が改訂された薬品の薬剤情報を下記の内容に変更します。

薬品名	改訂箇所		変更内容
エフピーOD錠 2.5mg	注意事項	下線部追加	胸の痛みや圧迫感、冷や汗がでる、ふらつき、胃の痛み、薬の減量や中止後の急な発熱・発汗などがみられたらご連絡下さい。一部の抗うつ剤(フルボキサミン、ミルナシプラン、アモキシセチン、デューロキセチン、ミルタサピン、アミトリアジン、パロキセチン、セルトラリン等)、トラマトール塩酸塩、タペンタール塩酸塩とは通常、同時に服用できません。
エリキユース錠 2.5mg/5mg	注意事項	下線部追加	青あざがでやすい、息切れ、呼吸がしにくい、から咳が出る、発熱する等がみられたらご連絡下さい。
ザイティガ錠250mg	注意事項	下線部追加	動悸、息切れ、足のむくみ、倦怠感、食欲不振、吐き気、嘔吐、けいれん、筋力の低下等がみられたらご連絡ください。
ザルティア錠5mg	注意事項	下線部追加	蕁麻疹がでる、皮膚が斑に赤くなる、水膨れ等がみられたらご連絡下さい。リオシグアトを服用中の方は通常服用できません。
フロリードゲル経口用2% 5g	注意事項	下線部追加	妊婦や妊娠の可能性のある方は通常使用できません。ピモジド、トリアゾラム、キニジン、シンバスタチン、アセルニジピン、ニソルジピン、エルゴタミン酒石酸塩、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、プロナンセリン、リバーロキサパン、アスナプレビルとは同時に使用できません。

薬品名	改訂箇所		変更内容
ベゲタミン-A配合錠	注意事項	下線部追加	このお薬については医師にご確認下さい。ポリコナゾール、タダラフィ ル、リルピピリン、ダクラタスビル、アスナプレビル、パニプレビルを服用 中の方は通常服用できません。
ベゲタミン-B配合錠	注意事項	下線部追加	このお薬については医師にご確認下さい。ポリコナゾール、タダラフィ ル、リルピピリン、ダクラタスビル、アスナプレビル、パニプレビルを服用 中の方は通常服用できません。
メモリーOD錠5mg/20mg	注意事項	下線部追加	けいれん、ふらつき、 <u>皮膚や白目が黄色くなる</u> 等がみられたらご連絡下 さい。
キプレス錠10mg	注意事項	下線部追加	蕁麻疹がでる、心臓がドキドキする、顔・首などがはれる、皮膚や白目が 黄色くなる、発熱、皮膚が斑に赤くなる、目の充血、唇のただれ、のどの 痛み、 <u>出血</u> 等がみられたらご連絡下さい。
シングレア細粒4mg/包	注意事項	下線部追加	蕁麻疹がでる、心臓がドキドキする、顔・首などがはれる、皮膚や白目が 黄色くなる、発熱、皮膚が斑に赤くなる、目の充血、唇のただれ、のどの 痛み、 <u>出血</u> 等がみられたらご連絡下さい。