



薬剤部DI室(2274) No. 238

◎本情報は以下のURLでも参照できます。  
<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/hosp/yakuzai/>

## 掲載内容(目次)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1 新規採用医薬品                  |   |
| 薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....  | 2 |
| 2 取扱い中止医薬品                 |   |
| 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 ..... | 2 |
| 2-2 販売中止による取扱い中止 .....     | 2 |
| 3 今月のトピックス                 |   |
| 3-1 医薬品に関する事項              |   |
| 1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....     | 2 |
| 2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....     | 3 |
| 3) 投薬日数制限解除 .....          | 3 |
| 4) 使用期限変更 .....            | 3 |
| 5) 販売元変更 .....             | 3 |
| 3-2 最近のお知らせ .....          | 3 |
| 4 添付文書改訂情報 .....           | 4 |
| 5 薬剤情報提供 .....             | 7 |

## 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

| 薬品名                            | 一般名       | 薬効等          | 開始日           |
|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| グリセリン「マルイシ」                    | グリセリン     |              | 平成27年4月2日(木)  |
| トラマールOD錠25mg                   | トラマドール塩酸塩 | がん疼痛・慢性疼痛治療剤 | 平成27年4月8日(水)  |
| トラマールOD錠50mg                   | トラマドール塩酸塩 | がん疼痛・慢性疼痛治療剤 | 平成27年4月10日(金) |
| ゾレドロン酸点滴静注<br>4mg/100mLバッグ「NK」 | ゾレドロン酸水和物 | 骨吸収抑制剤       | 平成27年4月14日(火) |

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

### 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

| 薬品名              | 備考                                 | 中止日           |
|------------------|------------------------------------|---------------|
| グリセリン「ヨシダ」       | グリセリン「マルイシ」500mLの採用に伴う中止           | 平成27年4月1日(水)  |
| ※ リルテック錠50mg     | 年度末中止薬品のため                         | 平成27年4月1日(水)  |
| エラプレース点滴静注液6mg   | 年度末中止薬品のため                         | 平成27年4月2日(木)  |
| ※ トラマールカプセル25mg  | トラマールOD錠25mgの採用に伴う中止               | 平成27年4月7日(火)  |
| ※ アロフト錠20mg      | 年度末中止薬品のため                         | 平成27年4月9日(木)  |
| ※ トラマールカプセル50mg  | トラマールOD錠50mgの採用に伴う中止               | 平成27年4月9日(木)  |
| ※ タガメット錠200mg    | 年度末中止薬品のため                         | 平成27年4月10日(金) |
| ゾメタ点滴静注4mg/100mL | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」の採用に伴う中止 | 平成27年4月13日(月) |
| ※ ユニシア配合錠HD      | ARB配合剤見直しのため                       | 平成27年4月15日(水) |

※印の薬品については、院外処方が可能です。

### 2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

## 3 今月のトピックス

### 3-1 医薬品に関する事項

#### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

| 薬品名               | 規格           | 一般名       | 薬効等                       |
|-------------------|--------------|-----------|---------------------------|
| ジャディアンス錠10mg/25mg | 1T:10mg/25mg | エンパグリフロジン | 選択的SGLT2阻害剤<br>-2型糖尿病治療剤- |
| セロシオンカプセル10mg     | 1CP:10mg     | プロパゲルマニウム | 経口B型慢性肝炎治療剤               |
| ノベルジンカプセル25mg     | 1CP:25mg     | 酢酸亜鉛水和物   | ウイルソン病治療剤(銅吸収阻害剤)         |
| ベピオゲル2.5%(15g/本)  | 1本:15g       | 過酸化ベンゾイル  | 尋常性ざ瘡治療剤                  |

## 2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

## 3) 投薬日数制限解除

5月1日(金)より、1回14日分までの制限が解除される医薬品

アデムパス錠0.5mg/1.0mg/2.5mg

コンサータ錠36mg

ザイザルシロップ 0.05%

ザルティア錠2.5mg/5mg

ジオトリフ錠20mg/30mg/40mg

スーグラ錠25mg/50mg

リオナ錠250mg

## 3-2 最近のお知らせ

- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 321 平成27年3月31日
- ・ 「デトキソール静注液2g」の取扱い中止について 平成27年3月31日
- ・ 「グリセリン500mL「マルイシ」」取扱い開始および「グリセリン500mL「ヨシダ」」取扱い中止について 平成27年4月1日
- ・ 「リルテック錠50mg」取扱い中止について 平成27年4月1日
- ・ 「エラプレース点滴静注液6mg」取扱い中止について 平成27年4月2日
- ・ 「トラマールOD錠25mg」取扱い開始および「トラマールカプセル25mg」取扱い中止について 平成27年4月7日
- ・ パス・スーパーセット薬品マスタの変更作業について 平成27年4月8日
- ・ 「アロフト錠20mg」取扱い中止について 平成27年4月9日
- ・ 「トラマールOD錠50mg」取扱い開始および「トラマールカプセル50mg」取扱い中止について 平成27年4月9日
- ・ ゴールデンウィーク期間の薬品請求について 平成27年4月10日
- ・ 「タガメット錠200mg」取扱い中止について 平成27年4月10日
- ・ 「ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」」取扱い開始および「ゾメタ点滴静注4mg/100mL」の取扱い中止について 平成27年4月13日
- ・ 「ユニシア配合錠HD」取扱い中止について 平成27年4月15日
- ・ 「ノボ・硫酸プロタミン静注用100mg」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 平成27年4月17日
- ・ 投与開始日4月29日(祝・水)の普通処方および、退院日4月29日(祝・水)の退院処方の取扱いについて 平成27年4月22日

## 4 添付文書改訂情報

### I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

| 薬品名                   | 成分名              |
|-----------------------|------------------|
| エルプラット点滴静注液50mg/100mg | オキサリプラチン         |
| ジェイゾロフトOD錠25mg/50mg   | 塩酸セルトラリン         |
| ジェイゾロフト錠25mg/50mg     | 塩酸セルトラリン         |
| ロンサーフ配合錠T15/T20       | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 |

### II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

| 薬品名                                               | 成分名                                | 重要度* |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| ヴオトリエント錠(グラクソ・スミスクライン)                            | パゾパニブ塩酸塩                           | 副    |
| エンドキサン錠(塩野義製薬)                                    | シクロホスファミド水和物                       | 副    |
| グラクティブ錠(小野薬品)                                     | シタグリプチンリン酸塩水和物                     | 副    |
| ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注(プリストル・マイヤーズ)                   | トリアムシノロンアセトニド(筋注用・皮内用・関節腔内用注射剤)    | 副    |
| ジャヌビア錠(MSD)                                       | シタグリプチンリン酸塩水和物                     | 副    |
| ベクティビックス点滴静注(武田薬品)                                | パニツムマブ(遺伝子組換え)                     | 副    |
| ムコスタ点眼液UD(大塚製薬)                                   | レバミピド(点眼剤)                         | 副    |
| 注射用エンドキサン(塩野義製薬)                                  | シクロホスファミド水和物                       | 副    |
| アイロミールエアゾール(大日本住友製薬)                              | サルブタモール硫酸塩(吸入エアゾール剤)               | その他  |
| アネメトロ点滴静注液(ファイザー)                                 | メロニダゾール(注射剤)                       | その他  |
| イーケプラドライシロップ(ユーシービー・ジャパン=大塚製薬)                    | レベチラセタム(経口剤)                       | その他  |
| イーケプラ錠(ユーシービー・ジャパン=大塚製薬)                          | レベチラセタム(経口剤)                       | その他  |
| ヴオトリエント錠(グラクソ・スミスクライン)                            | パゾパニブ塩酸塩                           | その他  |
| エリスロシンドライシロップW(アボットジャパン)                          | エリスロマイシンエチルコハク酸エステル                | その他  |
| エリスロシン錠(アボットジャパン)                                 | エリスロマイシンステアリン酸塩                    | その他  |
| エルプラット点滴静注液(ヤクルト)                                 | オキサリプラチン(治癒切除不能な進行・再発の胃癌の効能を有する製剤) | その他  |
| エンドキサン錠(塩野義製薬)                                    | シクロホスファミド水和物(経口剤)                  | その他  |
| オノアクト点滴静注用(小野薬品)                                  | ランジオロール塩酸塩(50mg・150mg)             | その他  |
| オンコピン注射用(日本化薬)                                    | ビンクリスチン硫酸塩                         | その他  |
| ガバペン錠(ファイザー)                                      | ガバペンチン                             | その他  |
| クラリスロマイシンDS小児用「EMEC」(メディサ新薬=エルメッドユーザイ)            | クラリスロマイシン(小児用)                     | その他  |
| クラリスロマイシン錠「タナベ」(田辺三菱製薬=田辺製薬販売)                    | クラリスロマイシン(成人用)                     | その他  |
| クラリスロマイシン錠小児用「杏林」(キョーリンリメディオ=富士フィルムファーマ=日本ジェネリック) | クラリスロマイシン(小児用)                     | その他  |

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

| 薬品名                               | 成分名                                 | 重要度* |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------|
| クラリス錠(大正製薬=大正富山医薬品)               | クラリスロマイシン(成人用)                      | その他  |
| ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注(ブリストル・マイヤーズ)   | トリアムシノロンアセトニド(筋注用・関節腔内用注射剤)         | その他  |
| コアベータ静注用(小野薬品)                    | ランジオロール塩酸塩(12.5mg)                  | その他  |
| サンディムンカプセル(ノバルティスファーマ)            | シクロスポリン(経口剤、注射剤)                    | その他  |
| サンディムンカプセル(ノバルティスファーマ)            | シクロスポリン(サンディムン、ネオーラル)               | その他  |
| サンディムン点滴静注用(ノバルティスファーマ)           | シクロスポリン(経口剤、注射剤)                    | その他  |
| サンディムン点滴静注用(ノバルティスファーマ)           | シクロスポリン(サンディムン、ネオーラル)               | その他  |
| ジェイゾロフト錠・OD錠(ファイザー)               | 塩酸セルトラリン                            | その他  |
| ジェノトロピンTC注用12mg(ファイザー)            | ソマトロピン(遺伝子組換え)(ジェノトロピン)             | その他  |
| シクロスポリンカプセル「トローワ」(東和薬品)           | シクロスポリン(経口剤、注射剤)                    | その他  |
| ジスロマックSR成人用ドライシロップ(ファイザー)         | アジスロマイシン水和物(成人用ドライシロップ剤)            | その他  |
| スナベプラカプセル(ブリストル・マイヤーズ)            | アスナプレビル                             | その他  |
| ダクルインザ錠(ブリストル・マイヤーズ)              | ダクラタビル塩酸塩                           | その他  |
| デュファストン錠(アボットジャパン)                | ジドロゲステロン                            | その他  |
| ネオーラル内用液・カプセル(ノバルティスファーマ)         | シクロスポリン(経口剤、注射剤)                    | その他  |
| ネオーラル内用液・カプセル(ノバルティスファーマ)         | シクロスポリン(サンディムン、ネオーラル)               | その他  |
| ノバルジンカプセル(ノーバルファーマ)               | 酢酸亜鉛水和物(カプセル剤)                      | その他  |
| ビデュリオン皮下注用(アストラゼネカ)               | エキセナチド(皮下注用)                        | その他  |
| フラジール内服錠(塩野義製薬)                   | メロニダゾール(経口剤)                        | その他  |
| ベネトリンシロップ(グラクソ・スミスクライン)           | サルブタモール硫酸塩(シロップ剤)                   | その他  |
| ベネトリン吸入液(グラクソ・スミスクライン)            | サルブタモール硫酸塩(吸入液)                     | その他  |
| ベネトリン錠(グラクソ・スミスクライン)              | サルブタモール硫酸塩(錠剤)                      | その他  |
| ペントシリン注射用(富山化学=大正富山医薬品)           | ピペラシリンナトリウム(1日最大投与量16gの用法・用量を有する製剤) | その他  |
| ムコスタ点眼液UD(大塚製薬)                   | レバミピド(点眼剤)                          | その他  |
| ラベキュアパック(エーザイ)                    | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン   | その他  |
| ラベファインパック(エーザイ)                   | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール     | その他  |
| ランサップ(武田薬品)                       | ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン       | その他  |
| ランピオンパック(武田薬品)                    | ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メロニダゾール         | その他  |
| リスパダールOD錠(ヤンセンファーマ)               | リスペリドン                              | その他  |
| リスパダール錠・細粒(ヤンセンファーマ)              | リスペリドン                              | その他  |
| リスパダール内用液(ヤンセンファーマ)               | リスペリドン                              | その他  |
| リスペリドンOD錠「ヨシトミ」(全星薬品=田辺三菱製薬=吉富薬品) | リスペリドン                              | その他  |
| リスペリドン細粒「ファイザー」(ファイザー)            | リスペリドン                              | その他  |
| リスペリドン内用液分包「ファイザー」(ファイザー)         | リスペリドン                              | その他  |

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

| 薬品名                                         | 成分名                       | 重要度* |
|---------------------------------------------|---------------------------|------|
| レバチオ錠(ファイザー)                                | シルデナフィルクエン酸塩(20mg)        | その他  |
| ロンサーフ配合錠(大鵬薬品)                              | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩          | その他  |
| 塩酸プロカルバジンカプセル「中外」(中外製薬)                     | プロカルバジン塩酸塩                | その他  |
| 注射用エンドキサン(塩野義製薬)                            | シクロホスファミド水和物(注射剤)         | その他  |
| 点滴静注用バンコマイシン「MEEK」<br>(小林化工=MeijiSeikaファルマ) | バンコマイシン塩酸塩(注射剤)(ジェネリック製品) | その他  |

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

## 5 薬剤情報提供

添付文書が改訂された薬品の薬剤情報を下記の内容に変更します。

| 薬品名                         | 改訂箇所 |       | 変更内容                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ヴオトリエント錠200mg               | 注意事項 | 下線部追加 | からだがだるい、吐き気、皮膚や白目が黄色くなる、頭痛、めまい、動悸、息苦しい、胸が痛い、しびれ、赤い斑ができる、むくみ尿量が減る、から咳、便に血が混じる、出血、視野が狭くなる、視力低下等みられたらご連絡ください。妊婦や妊娠している可能性のある方は通常服用できません。       |
| エリスロシンドライシロップ               | 注意事項 | 下線部追加 | 顔回の下痢、皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、尿の量が減る、めまい、胸痛、心臓がドキドキする、皮膚や白目が黄色くなる等みられたらご連絡下さい。ピモシド、アスナプレビルとは同時に服用できません。                                               |
| エンドキサン錠50mg                 | 注意事項 | 下線部追加 | 出血しやすい、急な腹痛、息苦しい、むくみのない短期間での体重増加、蕁麻疹、心臓がドキドキする、けいれん、皮膚が熱い・斑に赤くなる、水膨れ、皮膚や白目が黄色くなる、むくみ、尿の量が減る、筋肉の痛み等みられたらご連絡下さい。                              |
| グラクティブ錠 50mg                | 注意事項 | 下線部追加 | 蕁麻疹がでる、心臓がドキドキする、皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、冷汗が出る、ふらつく、皮膚や白目が黄色くなる、尿量が減る、急な腹痛、吐き気、から咳、息苦しい、筋肉の痛み、出血等みられたらご連絡下さい。                                         |
| クラリスロマイシン錠200mg             | 注意事項 | 下線部追加 | 蕁麻疹、心臓がドキドキする、皮膚や白目が黄色くなる、吐き気・全身倦怠感、のどの痛み、ふらつき、発熱、青あざができやすい、皮膚が斑に赤くなる、息苦しい、顔回の下痢、筋肉が痛む、尿が赤い、ふるえ、むくみ等みられたらご連絡下さい。同時に服用できないお薬については医師にご確認ください。 |
| クラリスロマイシンDS10%<br>小児用       | 注意事項 | 下線部追加 | 蕁麻疹、心臓がドキドキする、皮膚や白目が黄色くなる、吐き気・全身倦怠感、のどの痛み、ふらつき、発熱、青あざができやすい、皮膚が斑に赤くなる、息苦しい、顔回の下痢、筋肉が痛む、尿が赤い、ふるえ、むくみ等みられたらご連絡下さい。同時に服用できないお薬については医師にご確認ください。 |
| ジャヌビア錠 25mg                 | 注意事項 | 下線部追加 | 蕁麻疹がでる、心臓がドキドキする、皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、冷汗が出る、ふらつく、皮膚や白目が黄色くなる、尿量が減る、急な腹痛、吐き気、から咳、息苦しい、筋肉の痛み、出血等みられたらご連絡下さい。                                         |
| ネオーラルカプセル<br>10mg/25mg/50mg | 注意事項 | 下線部追加 | 発疹、めまい、手足のしびれ、のどが痛む、急な腹痛、吐き気、発熱、下痢、腹部・頸部・あごの下などのしこり、貧血、筋肉が痛む・こわばる、赤い尿がでる等みられたらご連絡下さい。妊婦や妊娠の可能性のある方は通常服用できません。同時に服用できないお薬については医師にご確認ください。    |
| ネオーラル内用液10%<br>50mL         | 注意事項 | 下線部追加 | 発疹、めまい、手足のしびれ、のどが痛む、急な腹痛、吐き気、発熱、下痢、腹部・頸部・あごの下などのしこり、貧血、筋肉が痛む・こわばる、赤い尿がでる等みられたらご連絡下さい。妊婦や妊娠の可能性のある方は通常服用できません。同時に服用できないお薬については医師にご確認ください。    |