



薬剤部DI室(2274) No. 241

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/hosp/yakuzai/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品	3
3) 投薬日数制限解除	3
4) 使用期限変更	3
5) 販売元変更	3
3-2 最近のお知らせ	3
4 添付文書改訂情報	4

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ジェイゾロフトOD錠25mg	塩酸セルトラリン	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	平成27年7月11日(土)
ベリプラストPコンピセット 組織接着用1mL		血漿分画製剤(生理的組織接着剤)	平成27年7月21日(火)

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
スベニールディスポ関節注 25mg/2.5mL	年度末中止薬品のため	平成27年7月9日(木)
※ ジェイゾロフト錠25mg	ジェイゾロフトOD錠25mgの採用に伴う中止	平成27年7月10日(金)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
カロナール錠500mg	1T:500mg	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
グラナテック点眼液0.4% 5mL	1本:5mL	リパスシル塩酸塩水和物	Rhoキナーゼ阻害薬/ 緑内障・高眼圧症治療剤
クロピドグレル錠75mg 「ファイザー」	1T:75mg	クロピドグレル硫酸塩	抗血小板剤
ジェントロピンゴークイック 注用5.3mg/12mg	1本:5.33mg/12.0mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	遺伝子組換え天然型 ヒト成長ホルモン製剤
チラーヂンS錠100μg	1T:100μg	レボチロキシナトリウム水和物	甲状腺ホルモン製剤
デカドロン錠4mg	1T:4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン製剤
ピソノテープ8mg	1枚:8mg	ビソプロロール	経皮吸収型β ₁ 遮断剤
ムコソルバンL錠45mg	1T:45mg	アンブロキシール塩酸塩	徐放性気道潤滑去痰剤
レトロゾール錠2.5mg「NK」	1T:2.5mg	レトロゾール	アロマターゼ阻害剤/ 閉経後乳癌治療剤
レボフロキサシン粒状錠500mg 「モチダ」	1包:500mg	レボフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤
レンビマカプセル4mg/10mg	1CP:4mg/10mg	レンパチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
ロゼックスゲル0.75% 50g	1本(50g):375mg	メロニタゾール	がん性皮膚潰瘍臭改善薬

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
リドーラ錠3mg	販売中止のため	平成27年7月31日(金)

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

ハンプ注射用1000
24ヵ月 → 36ヵ月 (長期安定性試験の結果より)

5) 販売元変更

フロリネフ錠0.1mg
ブリistol・マイヤーズ(株) → アスペンジャパン製薬(株) 平成27年8月1日

アザルフィジンEN錠250mg/500mg
タクロリムス錠0.5mg/1mg/1.5mg
メレート錠2mg
リマチル錠100mg
参天製薬(株) → あゆみ製薬(株) 平成27年8月3日

3-2 最近のお知らせ

- ・ 献血ベニロン-I 静注用の品薄状況に伴う免疫グロブリン製剤の医療保険上の取扱いについて 平成27年6月26日
- ・ 「ボルヒール組織接着用」の品薄状況について 平成27年7月6日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 324 平成27年7月8日
- ・ 「スベニールディスポ関節注25mg/2.5mL」取扱い中止について 平成27年7月9日
- ・ 「ジェイゾロフトOD錠25mg」取扱い開始および「ジェイゾロフト錠25mg」取扱い中止について 平成27年7月10日
- ・ 「ベリプラストPコンビセット組織接着用1mL」緊急採用のお知らせ 平成27年7月21日
- ・ 後発医薬品への切り換えの実施について 平成27年7月21日
- ・ 「バクトロバン鼻腔用軟膏2%」の出荷停止について 平成27年7月24日
- ・ 「イーケプラドライシロップ50%、イーケプラ錠500mg」の自主回収について 平成27年7月28日
- ・ 「フェロベリン配合錠」取扱い中止について 平成27年7月28日
- ・ 「ボルヒール組織接着剤1mL」取扱い一時中止のお知らせ 平成27年7月28日

4 添付文書改訂情報

下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)
エムラクリーム	リドカイン/プロピトカイン
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型/ニューユニット	酸化セルロース
ゾシン静注用2.25g/4.5g	タゾバクタム/ピペラシリン
ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素
リバロ錠1mg/2mg・OD錠1mg/2mg	ピタバスタチンカルシウム

院外処方専用医薬品のお知らせ

下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。

No.464

薬品名	規格	内容
CALONAL TAB. 500MG (劇) カロナル錠500mg	1T:500mg	【警告】 1. 本剤により重篤な肝障害が発現するおそれがあることに注意し、1日総量1500mgを 超す高用量で長期投与する場合には、定期的に肝機能等を確認するなど慎重に投 与すること。 2. 本剤とアセトアミノフェンを含む他の薬剤(一般用医薬品を含む)との併用により、アセトアミ ノフェンの過量投与による重篤な肝障害が発現するおそれがあることから、これらの薬剤と の併用を避けること。 【禁忌】 1. 消化性潰瘍のある患者 2. 重篤な血液の異常のある患者 3. 重篤な肝障害のある患者 4. 重篤な腎障害のある患者 5. 重篤な心機能不全のある患者 6. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 7. アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤による喘息発作の誘発)又はその既往歴のあ る患者
	薬価(円)	【効能・効果】 (1) 下記の疾患並びに症状の鎮痛 頭痛、耳痛、症候性神経痛、腰痛症、筋肉痛、打撲痛、捻挫痛、月経痛、分娩後痛、がん による疼痛、歯痛、歯科治療後の疼痛、変形性関節症 (2) 下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む) (3) 小児科領域における解熱・鎮痛
	1T:10.30円	【用法・用量】 効能又は効果(1)の場合 通常、成人にはアセトアミノフェンとして、1回300～1000mgを経口投与し、投与間隔は4～6 時間以上とする。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日総量として4000mgを限度 とする。また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。 効能又は効果(2)の場合 通常、成人にはアセトアミノフェンとして、1回300～500mgを頓用する。なお、年齢、症状により 適宜増減する。ただし、原則として1日2回までとし、1日最大1500mgを限度とする。また、 空腹時の投与は避けさせることが望ましい。 効能又は効果(3)の場合 通常、幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして、体重1kgあたり1回10～15mgを経口投与 し、投与間隔は4～6時間以上とする。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日総量 として60mg/kgを限度とする。ただし、成人の用量を超えない。また、空腹時の投与は 避けさせることが望ましい。
	薬効分類	【重副】 ショック、アナフィラキシー、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚 粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、急性汎発性発疹性膿疱症、喘息発作の誘 発、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、顆粒球減少症、間質性肺炎、間質性腎炎、急性腎不 全
アセトアミノフェン	871149	【会社名】 昭和薬品化工

上記薬品は平成27年8月1日(土)より院外処方オーダーリングが可能になります。

薬 剤 部

院外処方専用医薬品のお知らせ

下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。

No.465

薬品名	規格	内容
GLANATEC OPHTHALMIC SOLUTION 0.4% グラナテック点眼液O. 4% 5mL	1本:5mL	【禁忌】 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
	薬価(円)	【効能・効果】 次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合:緑内障、高眼圧症
	1本(5mL):2255.00円	【用法・用量】 1回1滴、1日2回点眼する。
	薬効分類	【備考】 授乳中止 2015年11月末日までは1回14日分の処方を限度
リパシジル塩酸塩水和物 BISONO TAPE 8MG	871141	【会社名】 興和創薬
ビソノテープ8mg	1枚:8mg	【禁忌】 1. 高度の徐脈(著しい洞性徐脈)、房室ブロック(Ⅱ、Ⅲ度)、洞房ブロック、洞不全症候群のある患者 2. 糖尿病性外アジドーシス、代謝性アジドーシスのある患者 3. 心原性ショックのある患者 4. 肺高血圧による右心不全のある患者 5. 強心薬又は血管拡張薬を静脈内投与する必要のある心不全患者 6. 非代償性の心不全患者 7. 重度の末梢循環障害のある患者(壊疽等) 8. 未治療の褐色細胞腫の患者 9. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人 10. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
	薬価(円)	【効能・効果】 本態性高血圧症(軽症～中等症)
	1枚:126.50円	【用法・用量】 通常、成人にはビソプロロールとして8mgを1日1回、胸部、上腕部又は背部のいずれかに貼付し、貼付後24時間ごとに貼りかえる。 なお、年齢、症状により1日1回4mgから投与を開始し、1日最大投与量は8mgとする。
	薬効分類	【重副】 心不全、完全房室ブロック、高度徐脈、洞不全症候群 【備考】 授乳中止 遮光
ビソプロロール	872149	【会社名】 トアエイヨー

上記薬品は平成27年8月1日(土)より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

院外処方専用医薬品のお知らせ

下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。

No.466

薬品名	規格	内容
MUCOSOLVAN L TABLET 45MG ムコソルバンL錠45mg	1T:45mg	【禁忌】 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 【効能・効果】 下記疾患の去痰 急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核、塵肺症、手術後の喀痰喀出困難
	薬価(円)	【用法・用量】 通常、成人には1回1錠(アンプロキソール塩酸塩として45mg)を1日1回経口投与する。
	1T:67.70円	【重副】 ショック、アナフィラキシー様症状、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)
	薬効分類	【備考】 授乳中止
アンプロキソール塩酸塩	872239	【会社名】 帝人ファーマ

上記薬品は平成27年8月1日(土)より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

院外処方専用医薬品のお知らせ

下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。

No.467

薬品名	規格	内容
GENOTROPIN GOQUICK INJ. 5.3MG ジェントロピンゴクイック 注用5.3mg/12mg	<5.3mg> 1本:5.33mg <12mg> 1本:12.0mg	【禁忌】 1. 糖尿病の患者 2. 悪性腫瘍のある患者 3. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人 4. プラダー・ウィリー症候群の患者のうち、高度な肥満又は重篤な呼吸器障害のある患者 【効能・効果】【用法・用量】 骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症 通常1週間に体重kg当たり、ソマトロピン(遺伝子組換え)として0.175mgを2～4回に分けて筋肉内に注射するか、あるいは6～7回に分けて皮下に注射する。 骨端線閉鎖を伴わない次の疾患における低身長ターナー症候群 通常1週間に体重kg当たり、ソマトロピン(遺伝子組換え)として0.35mgを2～4回に分けて筋肉内に注射するか、あるいは6～7回に分けて皮下に注射する。 骨端線閉鎖を伴わない次の疾患における低身長慢性腎不全 通常1週間に体重kg当たり、ソマトロピン(遺伝子組換え)として0.175mgを6～7回に分けて皮下に注射するが、投与開始6ヵ月後以降増量基準に適合した場合は0.35mgまで増量することができる。
	薬価(円)	骨端線閉鎖を伴わない次の疾患における低身長プラダー・ウィリー症候群 通常1週間に体重kg当たり、ソマトロピン(遺伝子組換え)として0.245mgを6～7回に分けて皮下に注射する。
	<5.3mg> 1本:40189.00円 <12mg> 1本:99252.00円	成人成長ホルモン分泌不全症(重症に限る) 通常開始用量として、1週間に体重kg当たり、ソマトロピン(遺伝子組換え)として0.021mgを6～7回に分けて皮下に注射する。患者の臨床症状に応じて1週間に体重kg当たり0.084mgを上限として漸増し、1週間に6～7回に分けて皮下に注射する。なお、投与量は臨床症状及び血清インスリン様成長因子-I(IGF-I)濃度等の検査所見に応じて適宜増減する。ただし、1日量として1mgを超えないこと。 骨端線閉鎖を伴わないSGA(small-for-gestational age)性低身長症 通常1週間に体重kg当たり、ソマトロピン(遺伝子組換え)として0.23mgを6～7回に分けて皮下に注射する。なお、効果不十分な場合は1週間に体重kg当たり0.47mgまで増量し、6～7回に分けて皮下に注射する。
	薬効分類	【重副】 痙攣、甲状腺機能亢進症、ネフローゼ症候群、糖尿病 【備考】 授乳中止 凍結を避け2～8℃に遮光保存すること
ソマトロピン(遺伝子組換え)	872412	【会社名】 ファイザー

上記薬品は平成27年8月1日(土)より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

院外処方専用医薬品のお知らせ

下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。

No.468

薬品名	規格	内容
THYRADIN-S TABLETS (劇) チラーヂンS錠100 μ g	1T:100 μ g (レボチロキシナトリウムとして)	【禁忌】 新鮮な心筋梗塞のある患者 【効能・効果】 粘液水腫、クレチン病、甲状腺機能低下症(原発性及び下垂体性)、甲状腺腫 【用法・用量】 レボチロキシナトリウムとして通常、成人25~400 μ gを1日1回経口投与する。 一般に、投与開始量には25~100 μ g、維持量には100~400 μ gを投与することが多い。 なお、年齢、症状により適宜増減する。
	薬価(円)	
	1T:11.40円	【重副】 狭心症、肝機能障害、黄疸、副腎クレーゼ、晩期循環不全 (類薬) ショック、うつ血性心不全
	薬効分類	【備考】 遮光
レボチロキシナトリウム水和物	872431	【会社名】 あすか

上記薬品は平成27年8月1日(土)より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

院外処方専用医薬品のお知らせ

下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。

No.469

薬品名	規格	内容
DECADRON TABLETS 4MG	1T:4mg	<p>【禁忌】 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>【原則禁忌】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有効な抗菌剤の存在しない感染症、全身の真菌症の患者 2. 消化性潰瘍の患者 3. 精神病の患者 4. 結核性疾患の患者 5. 単純疱疹性角膜炎の患者 6. 後囊白内障の患者 7. 緑内障の患者 8. 高血圧症の患者 9. 電解質異常のある患者 10. 血栓症の患者 11. 最近行った内臓の手術創のある患者 12. 急性心筋梗塞を起こした患者 13. コントロール不良の糖尿病の患者
デカドロン錠4mg	薬価(円)	
	1T:37.80円	
	薬効分類	
デキサメタゾン	872454	

【効能・効果】

内分泌疾患

慢性副腎皮質機能不全(原発性、続発性、下垂体性、医原性)、急性副腎皮質機能不全(副腎切除)、副腎性器症候群、亜急性甲状腺炎、甲状腺中毒症〔甲状腺(中毒性)危機〕、甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症、ACTH単独欠損症、特発性低血糖症、下垂体抑制試験

リウマチ性疾患

関節リウマチ、若年性関節リウマチ(スナル病を含む)、リウマチ熱(リウマチ性心炎を含む)、リウマチ性多発筋痛、強直性脊椎炎(リウマチ性脊椎炎)

膠原病

エリテマトーデス(全身性及び慢性円板状)、全身性血管炎(大動脈炎症候群、結節性動脈周囲炎、多発性動脈炎、ウェゲナー肉芽腫症を含む)、多発性筋炎(皮膚筋炎)、強皮症

腎疾患

ネフローゼ¹⁾及びネフローゼ²⁾症候群

心疾患

うっ血性心不全

アレルギー性疾患

気管支喘息、喘息性気管支炎(小児喘息性気管支炎を含む)、薬剤その他の化学物質によるアレルギー¹⁾・中毒(薬疹、中毒疹を含む)、血清病

血液疾患

紫斑病(血小板減少性及び血小板非減少性)、再生不良性貧血、白血病(急性白血病、慢性骨髄性白血病の急性転化、慢性リンパ¹⁾性白血病)(皮膚白血病を含む)、溶血性貧血(免疫性又は免疫性機序の疑われるもの)、顆粒球減少症(本態性、続発性)

消化器疾患

潰瘍性大腸炎、限局性腸炎、重症消耗性疾患の全身状態の改善(癌末期、スプルーを含む)

肝疾患

劇症肝炎(臨床的に重症とみなされるものを含む)、胆汁うっ滞型急性肝炎、慢性肝炎(活動型、急性再燃型、胆汁うっ滞型)(但し、一般的治療に反応せず肝機能の著しい異常が持続する難治性のものに限る)、肝硬変(活動型、難治性腹水を伴うもの、胆汁うっ滞を伴うもの)

肺疾患

サルコイドーシス(但し、両側肺門リンパ¹⁾節腫脹のみの場合を除く)、びまん性間質性肺炎(肺線維症)(放射線肺臓炎を含む)

重症感染症

重症感染症(化学療法と併用する)

結核性疾患

肺結核(粟粒結核、重症結核に限る)(抗結核剤と併用する)、結核性髄膜炎(抗結核剤と併用する)、結核性胸膜炎(抗結核剤と併用する)、結核性腹膜炎(抗結核剤と併用する)、結核性心¹⁾のう炎(抗結核剤と併用する)

神経疾患

脳脊髄炎(脳炎、脊髄炎を含む)(但し、一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ、かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること)、末梢神経炎(ギランバレー¹⁾症候群を含む)、筋強直症、重症筋無力症、多発性硬化症(視束脊髄炎を含む)、小舞蹈病、顔面神経麻痺、脊髄蜘蛛膜炎

悪性腫瘍

悪性リンパ¹⁾腫(リンパ¹⁾肉腫症、細網肉腫症、ホジキン病、皮膚細網症、菌状息肉症)及び類似疾患(近縁疾患)、好酸性肉芽腫、乳癌の再発転移

抗悪性腫瘍剤(シスプラチンなど)投与に伴う消化器症状(悪心・嘔吐)

外科疾患

副腎摘除、副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲、侵襲後肺水腫、臓器・組織移植、蛇毒・昆虫毒(重症の虫さされを含む)、原因不明の発熱

産婦人科疾患

卵管整形術後の癒着防止

泌尿器科疾患

前立腺癌(他の療法が無効な場合)、陰茎硬結

上記薬品は平成27年8月1日(土)より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

院外処方専用医薬品のお知らせ

下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。

No.470

薬品名	内容
DECADRON TABLETS 4MG デカドロン錠4mg デキサメタゾン 眼科疾患 内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法(ブドウ膜炎、網脈絡膜炎、網膜血管炎、視神経炎、眼窩炎性偽腫瘍、眼窩漏斗尖端部症候群、眼筋麻痺)、外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適当又は不十分な場合(眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、虹彩毛様体炎)、眼科領域の術後炎症 耳鼻咽喉科疾患 急性・慢性中耳炎、滲出性中耳炎・耳管狭窄症、メニエル病及びメニエル症候群、急性感音性難聴、血管運動(神経)性鼻炎、アレルギー性鼻炎、花粉症(枯草熱)、進行性壊疽性鼻炎、喉頭炎・喉頭浮腫、耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法、嗅覚障害、急性・慢性(反復性)唾液腺炎 歯科・口腔外科疾患 難治性口内炎及び舌炎(局所療法で治癒しないもの) <注釈>★印(適応の左肩) ★印の附されている適応に対しては、外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いることとされたものを示す。 【用法・用量】 1. デキサメタゾンとして、通常成人1日0.5～8mgを1～4回に分割経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 2. 抗悪性腫瘍剤(シスプラチンなど)投与に伴う消化器症状(悪心・嘔吐)の場合:通常、成人にはデキサメタゾンとして1日4～20mgを1～2回に分割経口投与する。 ただし、1日最大20mgまでとする。 【重副】 誘発感染症、感染症の増悪、続発性副腎皮質機能不全、糖尿病、消化性潰瘍、消化管穿孔、膵炎、精神変調、うつ状態、痙攣、骨粗鬆症、大腿骨及び上腕骨等の骨頭無菌性壊死、ミオパシー、脊椎圧迫骨折、長骨の病的骨折、緑内障、後囊白内障、血栓塞栓症 【備考】 授乳中止 【会社名】日医工	【効能・効果】 皮膚科疾患 ★湿疹・皮膚炎群(急性湿疹、亜急性湿疹、慢性湿疹、接触皮膚炎、貨幣状湿疹、自家感作性皮膚炎、アトピー皮膚炎、乳・幼・小児湿疹、ヒダール苔癬、その他の神経皮膚炎、脂漏性皮膚炎、進行性指掌角皮症、その他の手指の皮膚炎、陰部あるいは肛門湿疹、耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎、鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎など)(但し、重症例以外は極力投与しないこと)、★痒疹群(小児ストロフルス、蕁麻疹様苔癬、固定蕁麻疹を含む)(但し、重症例に限る。また、固定蕁麻疹は局注が望ましい)、蕁麻疹(慢性例を除く)(重症例に限る)、★乾癬及び類症〔尋常性乾癬(重症例)、関節症性乾癬、乾癬性紅皮症、膿疱性乾癬、けい留性肢端皮膚炎、疱疹状膿痂疹、ライター症候群〕、★掌蹠膿疱症(重症例に限る)、★扁平苔癬(重症例に限る)、成年性浮腫性硬化症、紅斑症(★多形滲出性紅斑、結節性紅斑)(但し、多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る)、アナフィラクトイド紫斑(単純型、シェンライン型、ヘノッホ型)(重症例に限る)、ウェーバー・クリスチアン病、粘膜皮膚眼症候群〔開口部びらん性外皮症、スチブンス・ジョンソン病、皮膚口内炎、フックス症候群、ペーチェット病(眼症状のない場合)、リップシュッツ急性陰門潰瘍)、レイノー病、★円形脱毛症(悪性型に限る)、天疱瘡群(尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡、Senear-Usher症候群、増殖性天疱瘡)、デューリング疱疹状皮膚炎(類天疱瘡、妊娠性疱疹を含む)、先天性表皮水疱症、帯状疱疹(重症例に限る)、★紅皮症(ヘブラ紅色靴襠疹を含む)、顔面播種状粟粒性狼瘡(重症例に限る)、アレルギー性血管炎及びその類症(急性痘瘡様苔癬状靴襠疹を含む)、潰瘍性慢性膿皮症、新生児スクレラマ

上記薬品は平成27年8月1日(土)より院外処方オーダーリングが可能になります。

薬 剤 部

院外処方専用医薬品のお知らせ

下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。

No.471

薬品名	規格	内容
ROZEX GEL 0.75% ロゼックスゲル0.75% 50g	1本(50g):375mg	【禁忌】 1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2. 脳、脊髄に器質的疾患のある患者(脳・脊髄腫瘍の患者を除く) 3. 妊娠3ヵ月以内の婦人
	薬価(円)	【効能・効果】 がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減
	1本(50g):5070.00円	【用法・用量】 症状及び病巣の広さに応じて適量を使用する。潰瘍面を清拭後、1日1~2回「ガーゼ」等にのぼして貼付するか、患部に直接塗布しその上を「ガーゼ」等で保護する。
	薬効分類	【備考】 授乳中止 2016年2月末日までは1回14日分の処方を限度
外ロニダゾール	872699	【会社名】 ガデルマ
CLOPIDOGREL TABLETS 75MG [PFIZER] クロピドグレル錠75mg 「ファイザー」	1T:75mg (クロピドグレルとして)	【禁忌】 1. 出血している患者(血友病、頭蓋内出血、消化管出血、尿路出血、喀血、硝子体出血等) 2. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
	薬価(円)	【効能・効果】 虚血性脳血管障害(心原性脳塞栓症を除く)後の再発抑制
	1T:121.30円	【用法・用量】 通常、成人には、クロピドグレルとして75mgを1日1回経口投与するが、年齢、体重、症状によりクロピドグレルとして50mgを1日1回経口投与する。
	薬効分類	【重副】 出血(頭蓋内出血、胃腸出血等の出血) [脳出血等の頭蓋内出血、硬膜下血腫等][吐血、下血、胃腸出血、眼底出血、関節血腫等]、胃・十二指腸潰瘍、肝機能障害、黄疸、血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)、間質性肺炎、好酸球性肺炎、血小板減少、無顆粒球症、再生不良性貧血を含む汎血球減少症、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形滲出性紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症、薬剤性過敏症症候群、後天性血友病、横紋筋融解症
クロピドグレル硫酸塩	873399	【備考】 授乳中止
		【会社名】 ファイザー

上記薬品は平成27年8月1日(土)より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

院外処方専用医薬品のお知らせ

下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。

No.472

薬品名	規格	内容
LETROZOLE TAB. 2.5MG 「NK」 (劇) レトロゾール錠2.5mg 「NK」	1T:2.5mg	【禁忌】 1. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人 2. 授乳婦 3. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 【効能・効果】 閉経後乳癌
	薬価(円)	【用法・用量】 通常、成人にはレトロゾールとして1日1回2.5mgを経口投与する。
	1T:292.60円	【重副】 血栓症、塞栓症、心不全、狭心症、肝機能障害、黄疸、中毒性表皮壊死症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、多形紅斑
	薬効分類	【備考】 授乳中止
	874291	【会社名】 日本化薬
レトロゾール		

上記薬品は平成27年8月1日(土)より院外処方オーダーリングが可能になります。

薬 剤 部

院外処方専用医薬品のお知らせ

下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。

No.473

薬品名	規格	内容
LENVIMA (劇) レンビマカプセル 4mg/10mg	1CP:4mg/10mg (レンパチニブとして)	【警告】 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に本剤の有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
	薬価(円)	【禁忌】 1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
	〈4mg〉 1CP:3956.40円 〈10mg〉 1CP:9354.20円	【効能・効果】 根治切除不能な甲状腺癌 【用法・用量】 通常、成人にはレンパチニブとして1日1回24mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。
	薬効分類	【重副】 高血圧、出血、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔、瘻孔形成、可逆性後白質脳症候群、心障害、手足症候群、感染症、骨髄抑制、低カルシウム血症、創傷治癒遅延 【備考】 授乳中止 2016年5月末日までは1回14日分の処方を限度
レンパチニブメシル酸塩	874291	【会社名】 エーザイ

上記薬品は平成27年8月1日(土)より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

院外処方専用医薬品のお知らせ

下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。

No.474

薬品名	規格	内容
LEVOFLOXACIN GRANULAR TABLETS 500MG MOCHIDA レボフロキサシン粒状錠 500mg「モチダ」	1包:500mg (レボフロキサシンとして)	<p>【禁忌】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本剤の成分又はオフロキサシンに対し過敏症の既往歴のある患者 2. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人 3. 小児等 <p>【効能・効果】</p> <p><適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、モラクセラ(フランハメラ)・カタラーリス、炭疽菌、大腸菌、赤痢菌、サルモネラ属、チフス菌、パラチフス菌、シロハクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンスシア属、ペスト菌、コレラ菌、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネバクター属、レジオネラ属、ブルセラ属、野兔病菌、カンピロバクター属、ヘプトストレプトコッカス属、アクネ菌、Q熱リケッチア(コクシエラ・フルネティ)、トラコーマクラミジア(クラミジア・トラコマティス)、肺炎クラミジア(クラミジア・ニューモニエ)、肺炎マイコプラズマ(マイコプラズマ・ニューモニエ)</p>
	薬価(円)	<p><適応症> 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡(化膿性炎症を伴うもの)、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、精巣上体炎(副睾丸炎)、尿道炎、子宮頸管炎、胆嚢炎、胆管炎、感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、コレラ、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、炭疽、ブルセラ症、ペスト、野兔病、Q熱</p> <p>【用法・用量】 通常、成人にはレボフロキサシンとして1回500mgを1日1回経口投与する。なお、疾患・症状に応じて適宜減量する。 腸チフス、パラチフスについては、レボフロキサシンとして1回500mgを1日1回14日間経口投与する。</p>
	1包:226.40円	<p>【重副】 ショック、アナフィラキシー、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、痙攣、QT延長、心室頻拍(Torsades de pointesを含む)、急性腎不全、間質性腎炎、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、汎血球減少症、無顆粒球症、溶血性貧血、血小板減少、間質性肺炎、好酸球性肺炎、偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎、横紋筋融解症、低血糖、アキレス腱炎、腱断裂等の腱障害、錯乱、せん妄、抑うつ等の精神症状、過敏性血管炎、重症筋無力症の悪化</p>
	薬効分類	<p>【備考】 授乳中止</p>
レボフロキサシン水和物	876241	【会社名】持田

上記薬品は平成27年8月1日(土)より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部