



薬剤部DI室(2274) No. 245

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/hosp/yakuzai/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品	2
3) 投薬日数制限解除	3
4) 使用期限変更	3
5) 販売元変更	3
3-2 最近のお知らせ	3
4 添付文書改訂情報	4
5 薬剤情報提供	6

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
イオダインスクラブ液7.5%	ポビドンヨード	外用殺菌消毒剤	平成27年10月29日(木)
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	完全ヒト型可溶性TNF α / LT α レセプター製剤	平成27年11月14日(土)

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
ポビドンヨードスクラブ液7.5%	イオダインスクラブ液7.5%の採用に伴う中止	平成27年10月28日(水)
※ 安息香酸ナトリウムカフェイン	年度末中止薬品のため	平成27年10月30日(金)
※ ザジテン点鼻液0.05% 8mL/瓶	年度末中止薬品のため	平成27年11月5日(木)
※ エンブレル皮下注用50mgシリンジ1.0mL	エンブレル皮下注用50mgペン1.0mLの採用に伴う中止	平成27年11月13日(金)
※ オングリザ錠5mg	薬事委員会の決定により中止	平成27年11月16日(月)
※ リノコートパウダースプレー鼻用25 μ g	年度末中止薬品のため	平成27年11月18日(水)
※ ペキロンクリーム 0.5%	クレナフィン爪外用液10%の採用に伴う中止	平成27年11月24日(月)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

該当なし

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

12月1日(火)より、1回14日分までの制限が解除される医薬品

アグリリンカプセル0.5mg
グラナテック点眼液0.4% 5mL
タブコム配合点眼液 2.5mL
バニヘップカプセル150mg
ベルソムラ錠15mg
ベルソムラ錠20mg
ボシュリフ錠100mg

4) 使用期限変更

ネオシネジンコーワ注1mg/1mL
2年 → 3年 (長期安定性試験の結果より)

ブレオ注射用5mg/15mg
2年 → 3年 (貯法変更により)

5) 販売元変更

オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL
オルガラン静注1250単位 1mL
MSD(株) → 共和クリティケア(株) 平成27年11月30日

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「アスタットクリーム1%」「アスタット外用液1%」「アスタット軟膏1%」の自主回収と欠品について 平成27年10月27日
- ・ 「イオダインスクラブ液7.5%」取扱い開始および「ポビドンヨードスクラブ液%」取扱い中止について 平成27年10月28日
- ・ 「安息香酸ナトリウムカフェイン」取扱い中止について 平成27年10月30日
- ・ 「ザジテン点鼻液0.05% 8mL」取扱い中止について 平成27年11月5日
- ・ 「ドレニゾンテープ4 μ g/cm²」の安定供給の再開について 平成27年11月13日
- ・ 「エンブレル皮下注50mgペン1.0mL」取扱い開始及び「エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL」の取扱い中止について 平成27年11月13日
- ・ ノバルティス ファーマ株式会社に対する行政処分について 平成27年11月13日
- ・ 「オングリザ錠5mg」取扱い中止について 平成27年11月16日
- ・ 「リノコートパウダースプレー鼻用25 μ g」取扱い中止について 平成27年11月18日
- ・ 「ペキロンクリーム0.5%」取扱い中止について 平成27年11月24日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トローワ」	オロパタジン塩酸塩
シプロロキサシ注300mg/150mL	シプロフロキサシン
ゼローダ錠300mg	カペシタビン
タイケルブ錠250mg	ラパチニブトシル酸塩水和物
献血グロベニン-I静注用2500mg/5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アボルブカプセル(グラクソ・スミスクライン)	デュタステリド	副
スンベプラカプセル(プリストル・マイヤーズ)	アスナプレビル	副
セフトリアキソンNa静注用「ファイザー」(ファイザー)	セフトリアキソンナトリウム水和物	副
ダクルインザ錠(プリストル・マイヤーズ)	ダクラタスビル塩酸塩	副
マグミット錠250mg・330mg (協和化学=シオエ=日本新薬=丸石:大阪)	酸化マグネシウム	慎重・注意
マグラックス錠(吉田製薬)	酸化マグネシウム	慎重・注意
ルリッド錠(サノフィ)	ロキシシロマイシン	慎重・副
レミニールOD錠・内用液(ヤンセンファーマ=武田薬品)	ガラントミン臭化水素酸塩	副
重カマ「ヨシダ」(吉田製薬)	酸化マグネシウム	慎重・注意
アボルブカプセル(グラクソ・スミスクライン)	デュタステリド	その他
アレセンサカプセル20mg・40mg(中外製薬)	アレクチニブ塩酸塩(20mg・40mg)	その他
アレビアチン散(大日本住友製薬)	フェニトイン	その他
アレビアチン錠(大日本住友製薬)	フェニトイン	その他
イグザレルト錠(バイエル薬品)	リバーロキサバン(錠剤)	その他
オラペネム小児用細粒(MeijiSeikファルマ)	テビペネムピボキシル	その他
キュビシン静注用(MSD)	ダブトマイシン	その他
クラビット点滴静注バッグ(第一三共)	レボフロキサシン水和物(注射剤)	その他
クロピドグレル錠「ファイザー」(マイラン製薬=ファイザー)	クロピドグレル硫酸塩(ジェネリック製品)	その他
サクシゾン注射用300mg(大正薬品工業=テバ製薬)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)(サクシゾン)	その他
ジプレキサザイデイス錠(日本イーライリリー)	オランザピン(口腔内崩壊錠)	その他
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「ファイザー」 (マイラン製薬=ファイザー)	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(小児用細粒剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
セフカペンピボキシル塩酸塩錠「ファイザー」 (マイラン製薬=ファイザー)	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠剤)	その他
セフジトレンピボキシル錠「サワイ」(沢井製薬)	セフジトレンピボキシル(錠剤)	その他
セフトリアキソンNa静注用「ファイザー」(ファイザー)	セフトリアキソンナトリウム水和物	その他
タキソール注射液(ブリistol・マイヤーズ)	パクリタキセル(非アルブミン懸濁型)	その他
テモダールカプセル(MSD)	テモゾロミド(経口剤)	その他
テモダール点滴静注用(MSD)	テモゾロミド(注射剤)	その他
ノウリアスト錠(協和発酵キリン)	イストラデフィリン	その他
ノーバルバル静注用(ノーバルファーマ)	フェノバルビタールナトリウム	その他
ヒダントールF配合錠(藤永製薬=第一三共)	フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン	その他
ヒダントール錠(藤永製薬=第一三共)	フェニトイン	その他
フェノバル散・錠・エリキシル(藤永製薬=第一三共)	フェノバルビタール	その他
フェノバル注射液(藤永製薬=第一三共)	フェノバルビタール	その他
ブリディオ静注(MSD)	スガマデクスナトリウム	その他
フロモックス小児用細粒(塩野義製薬)	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(小児用細粒剤)	その他
フロモックス錠(塩野義製薬)	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠剤)	その他
ホストイン静注(ノーバルファーマ=エーザイ)	ホスフェニトインナトリウム水和物	その他
マグミット錠250mg・330mg (協和化学=シオエ=日本新薬=丸石:大阪)	酸化マグネシウム	その他
マグラックス錠(吉田製薬)	酸化マグネシウム	その他
メイアクトMS小児用細粒(MeijiSeikファルマ)	セフジトレンピボキシル(小児用細粒剤)	その他
メイアクトMS錠(MeijiSeikファルマ)	セフジトレンピボキシル(錠剤)	その他
ユナシン-S静注用(ファイザー)	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	その他
ラミクタール錠・錠小児用(グラクソ・スミスクライン)	ラモトリギン	その他
ルリッド錠(サノフィ)	ロキシスロマイシン	その他
ワコビタール坐剤(高田製薬)	フェノバルビタールナトリウム	その他
重カマ「ヨシダ」(吉田製薬)	酸化マグネシウム	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

5 薬剤情報提供

添付文書が改訂された薬品の薬剤情報を下記の内容に変更します。

薬品名	改訂箇所		変更内容
アボルブカプセル0.5mg	注意事項	下線部追加	皮膚や白目が黄色くなる等がみられたらご連絡下さい。通常、女性の方は服用できません。
アレビアチン10倍散(原末量) / アレビアチン錠100mg	注意事項	下線部追加	このお薬については医師にご確認下さい。タダラフィル、アスナプレビル、ダクラタスビル、バニプレビル、マシテンタン、ソホスブビルを服用中の方は通常服用できません。
スンペプラカプセル100mg	注意事項	下線部追加	皮膚や白目が黄色くなる、吐き気、食欲不振、息切れ、呼吸がしにくい、から咳がでる等がみられたらご連絡ください。同時に服用できないお薬や健康食品については医師にご確認ください。
ダクルインザ錠60mg	注意事項	下線部追加	皮膚や白目が黄色くなる、吐き気、食欲不振、息切れ、呼吸がしにくい、から咳がでる等がみられたらご連絡ください。同時に服用できないお薬や健康食品については医師にご確認ください。妊婦や妊娠の可能性のある方は通常服用できません。
フェノバール散 10%/ フェノバール錠30mg	注意事項	下線部追加	皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、のどの痛み、出血しやすい、皮膚や白目が黄色くなる、発熱等がみられたらご連絡下さい。ポリコナゾール、タダラフィル、アスナプレビル、ダクラタスビル、バニプレビル、マシテンタを服用中の方は通常服用できません。
ルリッド錠150mg	注意事項	下線部追加	蕁麻疹がでる、心臓がドキドキする、頻回の下痢、息苦しくなる、出血しやすい、皮膚が斑に赤くなる・水膨れ、皮膚や白目が黄色くなる、胸がドキドキする等がみられたらご連絡下さい。
ワコビータル坐剤 50mg	注意事項	下線部追加	皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、のどの痛み、出血しやすい、皮膚や白目が黄色くなる、発熱等がみられたらご連絡下さい。ポリコナゾール、タダラフィル、アスナプレビル、ダクラタスビル、バニプレビル、マシテンタを服用中の方は通常服用できません。