



薬剤部DI室(2274) No. 248

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/hosp/yakuzai/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品	2
3) 投薬日数制限解除	2
4) 使用期限変更	2
5) 販売元変更	2
3-2 最近のお知らせ	3
4 添付文書改訂情報	3
5 薬剤情報提供	6

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

該当なし

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ プリミドン細粒99.5%「日医工」	アセリオ静注液1000mg、ダットスキャン静注の採用に伴う中止	平成28年1月27日(水)
※ マイコスポール外用液1% 10mL	ドボベツ軟膏の採用に伴う中止	平成28年2月8日(月)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
コバキソン皮下注20mgシリンジ「タケダ」	1本(1mL):20mg	グラチラマー酢酸塩	多発性硬化症治療剤
シングレアOD錠10mg	1T:10mg (モンテルカストとして)	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン受容体拮抗薬/気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療薬
ディフェリンゲル0.1%30g	1本:30g	アタパレン	尋常性ざ瘡治療剤
ピートルチュアブル錠 250mg/500mg	1T:250mg/500mg (鉄として)	スクロキシ水酸化鉄	高リン血症治療剤
ユリーフOD錠2mg/4mg	1T:2mg/4mg	シロドシン	選択的 α_{1A} 遮断薬/前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
トラマルカプセル25mg/50mg	販売中止のため	平成28年2月29日(月)

3) 投薬日数制限解除

3月1日(火)より、1回14日分までの制限が解除される医薬品

ジャディアンス錠10mg/25mg

タケキャブ錠10mg/20mg

ベピオゲル2.5%(15g/本)

ロゼックスゲル0.75% 50g

4) 使用期限変更

該当なし

5) 販売元変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「プリミドン細粒99.5%「日医工」」取扱い中止について 平成28年1月27日
- ・ 疑義照会詳細（平成27年12月分） 平成28年1月29日
- ・ 「抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ベネシス」」の販売名変更に伴うオーダマスタ登録名称の変更について 平成28年2月2日
- ・ 「ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」/100mL」取扱い中止について 平成28年2月2日
- ・ 「ネグミン液10%250mL」、「ネグミンガーグル7%30mL」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 平成28年2月5日
- ・ 「マイコスポール外用液1%10mL」取扱い中止について 平成28年2月8日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 330 平成28年2月12日
- ・ 院内副作用報告「ラミクタール」 平成28年2月12日
- ・ 「アボルブカプセル0.5mg」の安定供給の再開について 平成28年2月16日
- ・ 一般財団法人化学及血清療法研究所（化血研）の血漿分画製剤使用時の患者様への情報提供について 平成28年2月17日
- ・ 「コントミン糖衣錠12.5mg/25mg/50mg/100mg」の自主回収について 平成28年2月19日
- ・ 抗がん剤調製済薬剤における払出方法の一部変更について 平成28年2月23日
- ・ 「点滴静注用バンコマイシン0.5g「MEEK」」のオーダ登録名称の変更について 平成28年2月23日
- ・ イナビル吸入粉末剤の処方オーダ時の専用用法の追加について 平成28年2月23日
- ・ 疑義照会詳細（平成28年1月分） 平成28年2月25日

4 添付文書改訂情報

使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アイミクス配合錠LD・HD(大日本住友製薬=塩野義製薬)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	副
アジルバ錠(武田薬品)	アジルサルタン	副
アムロジピンOD錠2.5mg・5mg「EMEC」 (エルメッドエーザイ)	アムロジピンベシル酸塩	副
アムロジピン錠2.5mg・5mg「NP」(ニプロ)	アムロジピンベシル酸塩	副
アムロジン錠2.5mg・5mg, OD錠2.5mg・5mg・10mg (大日本住友製薬)	アムロジピンベシル酸塩	副
イトリゾールカプセル(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール	副
イトリゾール内用液(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール	副
ヴィキラックス配合錠(アッヴィ)	オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル	禁忌・注意・副
エックスフォージ配合錠(ノバルティスファーマ)	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	副
オフエブカプセル(日本ベーリンガーインゲルハイム)	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	注意
カデュエット配合錠(ファイザー)	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	副
ザクラス配合錠LD・HD(武田薬品)	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	副

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
サムチレール内用懸濁液(グラクソ・スミスクライン)	アトバコン	副
ゾシン静注用(大鵬薬品=大正富山医薬品)	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	副
ノルバスク錠5mg, OD錠2.5mg・5mg・10mg(ファイザー)	アムロジピンベシル酸塩	副
ペントシリン注射用(富山化学=大正富山医薬品)	ピペラシリンナトリウム	副
ミカムロ配合錠AP・BP (日本ベーリンガーインゲルハイム=アステラス製薬)	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	副
ユニシア配合錠LD・HD(武田薬品)	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	副
アザニン錠(田辺三菱製薬)	アザチオプリン	その他
アデラビン9号注(マイラン製薬=ファイザー)	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム (アデラビン、リバレス、レバサルト)	その他
アバスチン点滴静注用(中外製薬)	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	その他
アルチバ静注用(ヤンセンファーマ)	レミフェンタニル塩酸塩	その他
イトリゾールカプセル(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール(経口剤)	その他
イトリゾール内用液(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール(経口剤)	その他
イムラン錠(アスペンジャパン)	アザチオプリン	その他
インフリキシマブBS点滴静注用「NK」(日本化薬)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1]	その他
ヴィキラックス配合錠(アヅヴィ)	オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル	その他
エフピーOD錠(エフピー)	セレギリン塩酸塩 (レボドパ含有製剤非併用の用法・用量を有する製剤)	その他
エリキユース錠(ブリストル・マイヤーズ=ファイザー)	アピキサバン	その他
オフェブカプセル(日本ベーリンガーインゲルハイム)	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	その他
キシロカイン注ポリアンブ(アストラゼネカ)	リドカイン塩酸塩水和物	その他
キュバールエアゾール(大日本住友製薬)	バクロメタゾンプロピオン酸エステル(口腔用吸入剤)	その他
グルコバイOD錠(バイエル薬品=富士フィルムファーマ)	アカルボース	その他
グルコバイ錠(バイエル薬品=富士フィルムファーマ)	アカルボース	その他
コートロシンZ筋注(第一三共)	テトラコサクチド酢酸塩(0.5mg)	その他
サムチレール内用懸濁液(グラクソ・スミスクライン)	アトバコン	その他
シプロキサシ注300mg (バイエル薬品=富士フィルムファーマ)	シプロフロキサシン(小児の用法・用量を有しない製剤)	その他
シュアポスト錠(大日本住友製薬)	レパグリニド	その他
スイニー錠(三和化学=興和創薬)	アナグリプチン	その他
スープレックス吸入麻酔液(バクスター)	デスフルラン	その他
セルセプトカプセル(中外製薬)	ミコフェノール酸モフェチル(セルセプト)	その他
ゼローダ錠(中外製薬)	カペシタビン	その他
ゾシン静注用(大鵬薬品=大正富山医薬品)	タゾバクタム・ピペラシリン水和物(バイアル) (ゾシン、ケミックス、MeijiSeikaファルマ製品)	その他
ソナゾイド注射用(第一三共)	ペルフルプタン	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
タシゲナカプセル(ノバルティスファーマ)	ニロチニブ塩酸塩水和物	その他
トラクリア錠 (アクテリオンファーマシューティカルズジャパン)	ボセンタン水和物(62.5mg)	その他
パーロデル錠(ノバルティスファーマ)	プロモクリプチンメシル酸塩	その他
ビタミンC注「フソー」-100mg (扶桑薬品=アルブレッサファーマ)	アスコルビン酸(注射剤)(シータック、扶桑薬品製品)	その他
フィブラストスプレー(科研製薬)	トラフェルミン(遺伝子組換え)	その他
フェンタニル注射液「第一三共」 (第一三共プロファーマ=第一三共)	フェンタニルクエン酸塩(注射剤)	その他
フレズミンS注射液(エイワイファーマ=陽進堂)	ヒドロキシコバラミン酢酸塩(フレズミン)	その他
プロタミン硫酸塩静注「モチダ」(持田製薬)	プロタミン硫酸塩	その他
ペグイントロン皮下注用(MSD)	ペグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)	その他
ヘパフィルド透析用シリンジ (大塚製薬工場=ジェイ・エム・エス)	ヘパリンナトリウム(注射剤)	その他
ヘパリンNaロック用シリンジ「オーツカ」(大塚製薬工場)	ヘパリンナトリウム(注射剤)	その他
ヘパリンNa注「モチダ」(持田製薬)	ヘパリンナトリウム(注射剤)	その他
ヘパリンNa注「モチダ」(持田製薬)	ヘパリンナトリウム(注射剤) (添加剤としてベンジルアルコールを含有する製剤)	その他
ヘパリンNa透析用シリンジ「ニプロ」(ニプロ)	ヘパリンナトリウム(注射剤)	その他
ヘパリンカルシウム皮下注シリンジ「モチダ」(持田製薬)	ヘパリンカルシウム	その他
ベプリコール錠(MSD=第一三共)	ベプリジル塩酸塩水和物	その他
メチロン注(第一三共)	スルピリン水和物(注射剤)(メチロン)	その他
メロペン点滴用バイアル(大日本住友製薬)	メロペネム水和物	その他
リスモダンP静注(サノフィ)	ジソピラミドリン酸塩(注射剤)	その他
リスモダンR錠(サノフィ)	ジソピラミドリン酸塩(経口剤)	その他
レバトールカプセル(MSD)	リバビリン(カプセル剤)	その他
レミケード点滴静注用(田辺三菱製薬)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	その他
治療用標準化アレレルゲンエキス皮下注「トリエ」 スギ花粉(鳥居薬品)	標準化スギ花粉エキス原液(注射剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

5 薬剤情報提供

添付文書が改訂された薬品の薬剤情報を下記の内容に変更します。

薬品名	改訂箇所		変更内容
アジルバ錠20mg	注意事項	下線部追加	顔・のどなどがはれる、息苦しくなる、尿の量が減る、手足のしびれ、ふらつき、冷たく感じる、白目や皮膚が黄色くなる、筋肉痛、尿の色が赤い等がみられたらご連絡ください。妊婦や妊娠の可能性のある方、アリスレンを服用されている糖尿病の方は通常服用できません。
アムロジピンOD錠2.5mg(アムロジン)	注意事項	下線部追加	白目や皮膚が黄色くなる、出血しやすい、発熱、のどの痛み、めまい、筋肉痛、尿の色が赤い等がみられたらご連絡下さい。妊婦や妊娠の可能性のある方は通常服用できません。
アムロジピンOD錠5mg(アムロジン)	注意事項	下線部追加	白目や皮膚が黄色くなる、出血しやすい、発熱、のどの痛み、めまい、筋肉痛、尿の色が赤い等がみられたらご連絡下さい。妊婦や妊娠の可能性のある方は通常服用できません。
アイミクス配合錠HD	注意事項	下線部追加	顔・首などがはれる、皮膚や白目が黄色くなる、尿量が減る、脱力感、しびれ、赤い尿がでる、冷や汗がでる、ふらつき、めまい、出血しやすい、心臓がドキドキする、筋肉痛等がみられたらご連絡ください。妊婦や妊娠の可能性のある方、アリスレンを服用されている糖尿病の方は通常服用できません。
カデュエット配合錠4番	注意事項	下線部追加	発疹、白目や皮膚が黄色くなる、出血、発熱、喉の痛み、めまい、筋肉が痛む、赤い尿がでる、脱力感、動悸、皮膚が斑に赤くなる、のどが渇く、息苦しい、から咳、尿の色が赤い等がみられたらご連絡下さい。
イトリゾールカプセル50mg	注意事項	下線部追加	発疹、倦怠感、水膨れ、から咳、息切れ、息苦しい、白目や皮膚が黄色くなる、発熱、動悸、全身のむくみ等がみられたらご連絡下さい。妊婦、妊娠の可能性のある方は服用できません。同時に服用できないお薬については医師にご確認ください。
イトリゾール内用液1%	注意事項	下線部追加	発疹、倦怠感、水膨れ、から咳、息切れ、息苦しい、白目や皮膚が黄色くなる、発熱、動悸、全身のむくみ等がみられたらご連絡下さい。妊婦、妊娠の可能性のある方は服用できません。同時に服用できないお薬については医師にご確認ください。
エフピーOD錠 2.5mg	注意事項	下線部追加	胸の痛みや圧迫感、冷や汗がでる、ふらつき、胃の痛み、薬の減量や中止後の急な発熱・発汗などがみられたらご連絡下さい。一部の抗うつ剤(フルボキサミン、ミルナシプラン、アトモキセチン、デロキサセチン、ミルタサピン、アミトプチリン、パロキサチン、セルトラリン等)、トラマトール塩酸塩、タベンタール塩酸塩、ベンラファジンとは通常、同時に服用できません。
リスモダンR錠150mg	注意事項	下線部追加	動悸、めまい、すぐに息切れがする、冷や汗がでる、ふらつき、強固な便秘、眼がまぶしい・かすむ、手足のしびれ、発熱、のどの痛み、発疹、皮膚や白目が黄色くなる等がみられたらご連絡下さい。緑内障の方は通常服用できません。スバルフロキサシン、モキシフロキサシン、バルデナフィル、トリアメフェン、アミオダロン注、フィンゴリド、エリグリストットとは同時に使用できません。
ベプリコール錠50mg	注意事項	下線部追加	めまい、動悸、胸痛、発熱、のどの痛み、息苦しい、から咳等がみられたらご連絡下さい。妊婦や妊娠の可能性のある方は通常服用できません。リナビル、サキナビル、アタザナビル、ホスアプレナビル、イトラコナゾール、テラプレビル、アミオダロン注、エリグリストットとは同時に服用できません。
イムラン錠50mg	注意事項	下線部追加	のどの痛み、手足に赤い点やあざができる、出血しやすい、貧血、心臓がドキドキする、息苦しくなる、発疹、皮膚や白目が黄色くなる、発熱、重度の下痢、ふらつき、口のもつれ等がみられたらご連絡下さい。フェキソスタット、ヒドロキソスタットを服用中の方や妊婦や妊娠の可能性のある方は通常服用できません。