がん種	番号	レジメン名称	リンク
尿路上皮癌	47004	DTX+GEM	<u>シート</u>
尿路上皮癌	47015	キイトルーダ(1コース3週)	<u>ド</u>
尿路上皮癌	47016	キイトルーダ(1コース6週)	<u>デ</u>
尿路上皮癌	47017	バベンチオ	<u>シート</u>
転移性腎癌	49002	オプジーボ(1コース2週)	<u>シート</u>
切除不能•転移性腎細胞癌	49004	バベンチオ+インライタ療法	<u>シート</u>
転移性腎細胞癌	49005	キイトルーダ+インライタ療法	<u>シート</u>
転移性腎細胞癌	49006	キイトルーダ+インライタ併用療法	<u>シート</u>
転移性腎細胞癌	49007	オプジーボ(1コース4週)	<u>シート</u>
転移性腎細胞癌	49008	オプジーボ+カボ (1コース2週)	<u>シート</u>
転移性腎細胞癌	49009	オプジーボ+カボ (1コース4週)	<u>シート</u>
前立腺癌	46001	DTX(1コース3週)	<u>シート</u>
前立腺癌	46002	DTX(1コース4週)	シート
前立腺癌	46005	カバジタキセル	シート
尿路上皮癌	47018	パドセブ	シート
尿路上皮癌術後補助	47019	オプジーボ(240mg1コース2週)	<u>シート</u>
尿路上皮癌術後補助	47020	オプジーボ(480mg1コース4週)	<u>シート</u>
腎癌	49010	キイトルーダ200mg+レンビマ(1コース3週)	<u>シート</u>
腎癌	49011	キイトルーダ400mg+レンビマ(1コース6週)	シート
腎細胞癌術後補助化学療法	49012	キイトルーダ(1コース3週)	シート
腎細胞癌術後補助化学療法	49013	キイトルーダ(1コース6週)	<u>シート</u>

	カバジタキセル		46005	
	1コース日数	1	催吐リスク	7
	21日間		軽度	
	標準投与量		投与日	
ジル	25 mg/m ²		day1	
ン	10 mg×1回/日		day1-21	
	内服支持療法			
	標準投与量		投与日	
	特記事項			
		1コース日数 21日間 標準投与量 25 mg/m ² コン 10 mg×1回/日 内服支持療法 標準投与量	1コース日数 (1) 21日間 標準投与量 25 mg/m ² 10 mg×1回/日 内服支持療法 標準投与量	1コース日数 催吐リスク 程吐リスク 軽度 標準投与量 投与日 はい 25 mg/m² day1 day1-21 day1-21 内服支持療法 標準投与量 投与日 投与日

レジメン名		DTX(1コース4週)	レジメン No. 4600			
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	7	
前立腺癌		28日間		軽度		
一般名		標準投与量		投与日		
ドセタキセ	ル	75 mg/m ²		day1		
プレドニゾロ	コン	5 mg/日		day1-28		
		内服支持療法				
一般名		標準投与量		投与日		
		特記事項				

レジメン名		DTX(1コース3週) レジメン No.				
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7	
前立腺癌		21日間		軽度		
一般名		標準投与量		投与日		
ドセタキセ	ル	75 mg/m ²		day1		
プレドニゾロ	コン	5 mg/日		day1-21		
		内服支持療法				
一般名		標準投与量		投与日		
		特記事項				

レジメン名	+-	イトルーダ+インライタ併用圏	療法 レジメン No. 4900		
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
転移性腎細胞]癌	21日間		軽度	
一般名		標準投与量		投与日	
ペムブロリズ	マブ	200 mg/body		day1	
アキシチニ	ブ	5 mg×2回/日		day1-21	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名	+ -	イトルーダ+インライタ併用療	療法 レジメン No. 4900		
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
転移性腎細胞] 癌	42日間		軽度	
一般名		標準投与量		投与日	
ペムブロリズ	マブ	400 mg/body		day1	
アキシチニ	ブ	5 mg×2回/日		day1-42	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名		バベンチオ+インライタ療法 No.			
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
切除不能・転移性	腎細胞癌	14日間		軽度	
一般名		標準投与量		投与日	
アベルマフ	j `	10 mg/kg		day1	
アキシチニ	ブ	5 mg×2回/日		day1-14	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

オプジ-ボ	レジメン No. 490		
1コース日数	1	催吐リスク	7
14日間		最小度	
標準投与量		投与日	
240 mg/body		day1	
内服支持療法			
標準投与量		投与日	
特記事項			
	1コース日数 14日間 標準投与量 240 mg/body 内服支持療法 標準投与量	111一次日数 (14日間	No. No. 1コース日数 催吐リスク イロ間 最小度 根準投与量 投与日 240 mg/body day1 内服支持療法 標準投与量 投与日 投与日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

レジメン名		オプジ-ボ	レジメン No. 490		
対象癌種		1コース日数	1	7	
転移性腎癌		28日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
二ボルマフ)`	480 mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名	オ	プジーボ+カボ(1コース2週	周) レジメン No. 490		
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
転移性腎癌		14日間		軽度	
一般名		標準投与量		投与日	
ニボルマン)`	240 mg/body		day1	
カボザンチニ	ニブ	40 mg×1回/日(空腹時)		day1-14	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名	オ	オプジーボ+カボ(1コース4週)		週) レジメン No. 490		
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7	
転移性腎癌		28日間		軽度		
一般名		標準投与量		投与日		
二ボルマフ	j`	480 mg/body		day1		
カボザンチニ	ニブ	40 mg×1回/日(空腹時)		day1-28		
		内服支持療法				
一般名		標準投与量		投与日		
		特記事項				

レジメン名		キイトルーダ(1コース3週)	レジメン No. 47		
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
尿路上皮癌	- - -	21日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
ペムブロリズ	マブ	200 mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名	バベンチオ No.			47017	
対象癌種		1コース日数	催吐リスク		
尿路上皮癌	-	14日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
アベルマフ) `	10 mg/kg		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名		DTX+GEM	レジメン No. 47004		
対象癌種		1コース日数	催吐リスク		
尿路上皮癌		21日間	軽度		
一般名		標準投与量	投与日		
ゲムシタビ	ン	1000 mg/m ²	day1,8		
ドセタキセ	レ	70 mg/m ²	day8		
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
	特記事項				

レジメン名		キイトルーダ(1コース6週)		レジメン No.	47016
対象癌種		1コース日数	催吐リスク		7
尿路上皮癌		42日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
ペムブロリズ	マブ	400 mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
		特記事項			

レジメン名		パドセブ	レジメン No. 47018
対象癌種		1コース日数	催吐リスク
尿路上皮瘤	-	28日間	軽度
一般名		標準投与量	投与日
エンホルツマブ	ベドチン	1.25 mg/kg	day1, 8, 15
		内服支持療法	
一般名		標準投与量	投与日
		特記事項	
I			

レジメン名	オ	オプジーボ(240mg1コース2週) レジメン No.		47019	
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
尿路上皮癌 術後補助		14日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
ニボルマフ) `	240 mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
		特記事項			

レジメン名	オ	オプジーボ(480mg1コース4週) レジメン No.			47020
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
尿路上皮癌 術後補助		28日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
二ボルマフ	j`	480 mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
		特記事項			

レジメン名	キイトル	レーダ200mg+レンビマ(1コ-]ース3週) レジメン No. 490		49010
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
腎癌		21日間		中等度	
一般名		標準投与量		投与日	
ペムブロリズ	マブ	200 mg/body		day1	
レンバチニ	ブ	1日1回20mg		day1-21	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
		特記事項			

レジメン名	キイトル	ノーダ400mg+レンビマ(1コ-]ース6週) レジメン No. 490		49011
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
腎癌		42日間		中等度	
一般名		標準投与量		投与日	
ペムブロリズ	マブ	400 mg/body		day1	
レンバチニ	ブ	1日1回20mg		day1-42	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
		特記事項			

レジメン名	:	キイトルーダ(1コース3週)	8週) レジメン No. 49			
対象癌種		1コース日数	催吐リスク		7	
腎細胞癌術後補助	化学療法	21日間		最小度		
一般名		標準投与量		投与日		
ペムブロリズ	マブ	200 mg/body		day1		
		内服支持療法				
一般名		標準投与量		投与日		
		特記事項				

レジメン名	:	キイトルーダ(1コース6週)		レジメン No.	49013		
対象癌種		1コース日数	催吐リスク		催吐リスク		7
腎細胞癌術後補助極	化学療法	42日間		最小度			
一般名		標準投与量		投与日			
ペムブロリズ	マブ	400 mg/body		day1			
		内服支持療法					
一般名		標準投与量		投与日			
		特記事項					